

ภาคผนวก จ.

ตัวอย่างกระดาษเช็ดจานอ้อยที่ได้จากการทดลอง น้ำหนัก 70 กรัม
โดยใส่สาร AKD สารเติมแต่งชนิด Lodyne[®] และแป้งคัดแปร

รูปที่ จ.1 แป้งประจุบวก 1%, AKD 0.1%, Lodyne[®] 0.2% ต่อน้ำหนักเยื่อแห้ง

รูปที่ จ.2 แป้งประจุบวก 1%, AKD 0.1%, Lodyne[®] 0.5% ต่อน้ำหนักเยื่อแห้ง

รูปที่ จ.3 แป้งประจุบวก 1%, AKD 0.1%, Lodyne[®] 0.8% ต่อน้ำหนักเยื่อแห้ง

รูปที่ จ.4 แป้งประจุบวก 1%, AKD 0.1%, Lodyne[®] 1.1% ต่อน้ำหนักเยื่อแห้ง

รูปที่ จ.5 แป้งประจุบวก 1%, AKD 0.3%, Lodyne[®] 0.2% ต่อน้ำหนักเยื่อแห้ง

รูปที่ จ.6 แป้งประจุบวก 1%, AKD 0.3%, Lodyne[®] 0.5% ต่อน้ำหนักเยื่อแห้ง

รูปที่ จ.7 แป้งประจุบวก 1%, AKD 0.3%, Lodyne[®] 0.8% ต่อน้ำหนักเยื่อแห้ง

รูปที่ จ.8 แป้งประจุบวก 1%, AKD 0.3%, Lodyne[®] 1.1% ต่อน้ำหนักเยื่อแห้ง