

- 2) Depression มีข้อคำถามทั้งหมด 20 ข้อ
- 3) Anxiety มีข้อคำถามทั้งหมด 15 ข้อ
- 4) Psychotic มีข้อคำถามทั้งหมด 10 ข้อ
- 5) Social Function มีข้อคำถามทั้งหมด 15 ข้อ

การแปลผลข้อมูล

แบบวัดสุขภาพจิตของคนไทยมีความถูกต้องเชิงโครงสร้าง (construct validity) และความถูกต้องด้านอำนาจจำแนก (Discrimination validity) แบบวัดมีความเชื่อมั่น (Internal Consistency Reliability) แบบครอนบาคแอลฟา 0.82-0.94 แปลผลคะแนนแยกตามรายด้าน

แบบวัดสุขภาพจิตของคนไทยใช้มาตรประเมิน แบบ 5 มาตร ประกอบด้วย

- ไม่มี (0) หมายถึง ท่านไม่เคยมีหรือไม่เคยรู้สึกเลยในตลอดช่วงระยะเวลา 1 เดือน
- เล็กน้อย (1) หมายถึง ท่านเคยมีหรือเคยรู้สึก คือ ประมาณครึ่งหรือสองครั้งในช่วง 1 เดือน
- ปานกลาง (2) หมายถึง ท่านเคยมีหรือเคยรู้สึกพอประมาณ คือ ประมาณสัปดาห์ละครั้ง
- ค่อนข้างมาก หมายถึง ท่านเคยมีหรือเคยรู้สึกหลายๆ ครั้งใน 1 สัปดาห์
- มาก หมายถึง ท่านเคยมีหรือเคยรู้สึกบ่อยมาก คือเกือบทุกวัน

การแปลผลจะนำคะแนนของแต่ละข้อมารวมคะแนนแต่ละด้านแล้วหารด้วยจำนวนข้อ แล้วนำคะแนนนั้นไปคำนวณหา T-Score แล้วจึงนำไปเทียบกับค่า T-Score ถ้าคะแนนที่อยู่ในช่วง 40-65 หมายถึง ภาวะสุขภาพจิตปกติ ถ้าคะแนนที่สูงกว่า 65 หมายถึงมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ผู้วิจัยพบนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทุกชั้นปี ขอความร่วมมือ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยประกอบด้วยวัตถุประสงค์การทำวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นสอบถามความสมัครใจ และให้นักศึกษาที่สมัครใจเซ็นต์ใบยินยอมให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยใบยินยอมต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. ผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม การใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 10-15 นาที ชักถามข้อสงสัย ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม และรวบรวม

แบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง โดยนำแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์ครบถ้วนไป
วิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows ดังนี้
 - 1.1 ข้อมูลทั่วไป คะแนนของแบบวัดสุขภาพจิตของคนไทย วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา คะแนนเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 - 1.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบวัดสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลในชั้นปีที่ 1-4 โดยใช้สถิติ one-way ANOVA
 - 1.3 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนภาวะสุขภาพจิตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson's Correlation Coefficient)