

บทที่ 4

ผลการวิจัย

ระบบนิเวศบริเวณแม่น้ำมูล

สภาพทั่วไปของแม่น้ำมูล

แม่น้ำมูลมีลักษณะคดเคี้ยวมาก บางช่วงลำน้ำแยกออกจากกันเป็น 2 สาย แล้วมาบรรจบกัน โดยมีเกาะแก่งอยู่ในบริเวณกลางลำน้ำ โดยส่วนใหญ่เป็นเกาะแก่งที่มีไม้พุ่มขึ้นปกคลุมหนาแน่น แม่น้ำมูลบางบริเวณมีลักษณะกว้างมาก เนื่องจากกิจกรรมการดูทรายและการถูกระแสน้ำกัดเซาะริมฝั่ง สภาพฝั่งแม่น้ำบางบริเวณมีลักษณะสูงชัน บางบริเวณมีลักษณะเป็นหาดทราย สภาพดินริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่รอบน้ำมีทั้งที่เป็นดินเหนียว ดินทรายและดินโคลน

พืชน้ำมีทั้งบัวสาย บัวหลวง ผักตบชวา กระเจ็บ สันตะวา และสาหร่าย ส่วนพืชริมฝั่งแม่น้ำเป็นพวกไม้พุ่ม เช่น หูลิง เสือหมอบ หนามจาง ตาปลา ข่อย มะดัน จิกน้ำ ใผ่ และมีหลายบริเวณถูกแผ้วถางเปลี่ยนสภาพเป็นป่ายูคาลิปตัส

ตลอดลำน้ำที่มีลักษณะคดเคี้ยว มีลำน้ำสาขา คือ ลำปลายมาศ ห้วยลำพังชู ลำสะเทต และลำชี รวมทั้งกุดอีกหลายแห่ง พื้นที่ริมฝั่งส่วนใหญ่เป็นป่าทามที่มีไม้พุ่มขึ้นอยู่ทั่วไป น้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ส่วนในฤดูแล้งน้ำแห้งเป็นที่เลี้ยงสัตว์ หาเห็ดและหาสัตว์ป่าของชาวบ้าน ปัจจุบันป่าทามถูกบุกรุกแผ้วถางไปมาก เพื่อปลูกยูคาลิปตัสหรือพืชชนิดอื่น ๆ คงเหลือพื้นที่ป่าทามอยู่ไม่มากและมีการบุกรุกแผ้วถางเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ในบางบริเวณยังมีการถมดินโอบล้อมบริเวณที่ทามเดิม ทำให้ลำน้ำแคบลง กระแสน้ำไหลไม่สะดวกและเปลี่ยนทิศทางในฤดูน้ำหลาก ก่อให้เกิดปัญหาน้ำกัดเซาะฝั่งตรงข้ามและปัญหาน้ำท่วมตามมา

ระบบนิเวศบริเวณแม่น้ำมูลมีความหลากหลายมาก ทั้งในลำน้ำและบริเวณริมฝั่ง เนื่องจากสภาพพื้นที่มีลักษณะแตกต่างกันหลายแบบและความลึกของระดับน้ำมีหลายระดับตามธรรมชาติ จึงเป็นที่อยู่อาศัย วางไข่ หาอาหารและหลบซ่อนของสัตว์น้ำได้เป็นอย่างดี ทำให้มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงตามไปด้วย

สภาพน้ำในแม่น้ำมูล

น้ำในแม่น้ำมูลค่อนข้างขุ่นในฤดูฝนและใสในฤดูแล้ง มีค่าความโปร่งแสงอยู่ระหว่าง 17 - 98 เซนติเมตร เนื่องจากในฤดูฝนระดับน้ำค่อนข้างลึกและไหลเร็ว ส่วนฤดูแล้งระดับน้ำตื้นและไหลค่อนข้างช้า ค่าความเป็นกรดเบส (pH) อยู่ระหว่าง 6 - 8 ปริมาณออกซิเจน (DO) อยู่ระหว่าง 5.4 - 8.3 มิลลิกรัม/ลิตร และอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23 - 34 องศาเซลเซียส

บริบทชุมชน

ผลการศึกษาบริบทชุมชนบ้านชนาก ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และบ้านอ้อตลิ่งชัน ตำบลสระซุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปรากฏผลโดยสรุปดังนี้

บ้านชนาก

บ้านชนาก ตั้งอยู่ในตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 172 ครัวเรือน จำนวน 817 คน ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข ดังนี้

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ชุมชนบ้านชนาก เป็นชุมชนสังคมชนบท ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเอง แต่ได้ผลผลิตไม่ค่อยแน่นอน การทำนาอาศัยน้ำฝนเป็นส่วนใหญ่ บางปีฝนแล้ง บางปีน้ำท่วมผลผลิตเสียหาย ทำให้ชาวบ้านบางส่วนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยรุ่นและวัยทำงานนิยมไปทำงานต่างถิ่น

อาชีพหลักของชาวชุมชนคือการทำนาและอาชีพรับจ้าง อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย เป็ด ไก่ ในบ้านชนากมีหลายครัวเรือนที่ยึดอาชีพประมงเป็นอาชีพเสริม โดยการจับปลาในแม่น้ำมูล ซึ่งสามารถทำการประมงได้ตลอดปี เครื่องมือประมงที่ชาวบ้านใช้ ได้แก่ มอญ (ข่าย) แห อวน สวิง เบ็ดและลอบ

ด้านสาธารณสุข

ชุมชนบ้านชนากเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวอำเภอ เมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพสามารถไปรับบริการที่โรงพยาบาลประจำอำเภอได้สะดวก จากการศึกษาพบว่าชาวบ้านไม่มีปัญหาด้านสาธารณสุข

บ้านอ้อตลิ่งชัน

บ้านอ้อตลิ่งชัน ตั้งอยู่ในตำบลสระซุด อำเภอมุมพละบุรี จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 25 กิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 165 ครัวเรือน จำนวน 807 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข ดังนี้

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ชุมชนบ้านอ้อตลิ่งชัน เป็นชุมชนสังคมชนบท ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเอง แต่ได้ผลผลิตไม่ค่อยแน่นอน มีระบบชลประทานแต่ไม่ทั่วถึง การทำนาอาศัยน้ำฝนเป็นส่วนใหญ่ บางปีฝนแล้ง บางปีน้ำท่วมผลผลิตเสียหาย ทำให้ชาวบ้านมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านบางส่วนไปทำงานต่างถิ่น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยรุ่น ชาวบ้านอยู่กันแบบพอกินพอใช้ มีอาชีพเสริมจากการทำนา ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย เป็ด ไก่ และอาชีพรับจ้าง การจับปลาในแม่น้ำมูลส่วนใหญ่จับเพื่อนำมาประกอบอาหาร โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น มอง แห อวน สวิง เบ็ด ลอบและดัก

บ้านอ้อตลิ่งชันมีโรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 การเดินทางเข้าสู่ตัวอำเภอค่อนข้างลำบากเพราะระยะทางไกลและไม่มีการโดยสารประจำทางผ่าน

ด้านสาธารณสุข

บ้านอ้อตลิ่งชันมีสถานอนามัยอยู่ภายในหมู่บ้าน เมื่อเจ็บป่วยจึงไปขอรับการรักษาได้สะดวก จากการศึกษพบว่าชาวบ้านมีปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ คือ โรคเบาหวาน

การใช้ประโยชน์จากแม่น้ำมูล

ประชาชนในบ้านชนาก บ้านอ้อตลิ่งชัน และหมู่บ้านใกล้เคียงใช้ประโยชน์จากแม่น้ำมูลในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
2. ใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม เช่น ทำนา เพาะปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์
3. ใช้น้ำเพื่อทำเครื่องมือประมง เครื่องใช้และใช้เป็นเชื้อเพลิง
4. ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปู หอย ปลา เพื่อเป็นอาหารและจำหน่ายเพื่อเป็นอาหารและปลาสวยงาม รวมทั้งมีการแปรรูป เช่น ปลาร้า ปลาจิ้ม ปลาแห้ง ปลาป่นและปลาเค็ม

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

1. นักเรียนจากโรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน ตำบลสระซุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์และชาวบ้านในชุมชนรวมทั้งนักเรียนโรงเรียนบ้านเพี้ยแก้ว อำเภอพุทธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมเรียนรู้โดยออกฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คือ อุณหภูมิ ความโปร่งแสง ความเป็นกรดเบส (pH) และปริมาณออกซิเจน (DO) รวมทั้งการศึกษาศัตรูพืชการชีวภาพพวกสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลา กุ้ง ปูและหอย โดยอาศัยชาวบ้านเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล
2. ได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำมูล เผยแพร่ให้ชาวบ้านในชุมชนได้ศึกษา

แนวทางการอนุรักษ์แม่น้ำมูลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

จากการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับครูนักเรียนและชุมชน ทำให้ครู นักเรียน โรงเรียนและชุมชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และการพัฒนาบริเวณแม่น้ำมูลเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จึงเริ่มมีการรวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

1. กลุ่มนักเรียนได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์แม่น้ำมูล โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 - 1.1 เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของแม่น้ำมูล
 - 1.2 เพื่อป้องกันและกำจัดคราบน้ำมันและวัชพืชน้ำในแม่น้ำ
 - 1.3 เพื่อกำหนดข้อตกลงในการทำประมงเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ
 - 1.4 เพื่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ในการหาแนวทางอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ
 - 1.5 พัฒนาระบบนิเวศบริเวณลำน้ำโดยการปลูกต้นไม้
2. กลุ่มชาวบ้านในชุมชนกำลังดำเนินการร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้านก่อตั้งกลุ่มชาวชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 - 2.1 เพื่าวางแผนการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้
 - 2.1.1 สัตว์น้ำ มีการกำหนดข้อกำหนดในการจับสัตว์น้ำ เช่น ห้ามใช้เครื่องมือบางชนิด คือ ไฟฟ้าและยาเบื่อ รวมทั้งห้ามจับสัตว์น้ำในบางฤดู เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตว์น้ำ

2.1.2 ระบบนิเวศ

2.1.2.1 คอยเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขการทิ้งของเสียลงแม่น้ำ โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องจากเครื่องจักรที่ใช้ในบริเวณลำน้ำ

2.1.2.2 มีข้อกำหนดการตัดไม้ในป่าทามในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล

2.1.2.3 กำหนดเขตป่าทามเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลาย

2.1.2.4 หาวิธีป้องกันและกำจัดวัชพืชน้ำ

2.2 พัฒนาศักยภาพการสัตว์น้ำ หาแนวทางดำเนินการเพื่อประสานงานกับส่วนราชการ ให้นำพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ปลาและกุ้งก้ามกรามมาปล่อย เนื่องจากชาวบ้านที่หาปลามีจำนวนมากขึ้น เครื่องมือมีประสิทธิภาพมากขึ้น จับสัตว์น้ำได้มากขึ้น ทำให้สัตว์น้ำในแม่น้ำมูลลดจำนวนลง

3. เริ่มมีกลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันเลี้ยงปลาในกระชังด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูป จึงมีการร่วมมือกันในการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลกระทบจากการดูทรายและการทิ้งน้ำมันลงในแม่น้ำ เนื่องจากชาวบ้านสงสัยว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาตาย

ความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืด

จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืดในแม่น้ำมูล ในเขตจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์และสุรินทร์ พบปลาน้ำจืด จำนวน 24 วงศ์ (Family) 64 สกุล (Genus) 107 ชนิด (Species) (ภาพที่ 3)

การจัดหมวดหมู่และการแพร่กระจายของปลาน้ำจืดในแม่น้ำมูล ในเขตจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์และสุรินทร์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การจัดหมวดหมู่และการแพร่กระจายของปลาน้ำจืดในแม่น้ำมูล ค่ายอมี

ดังต่อไปนี้ A = บ้านท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ B = บ้านเปลาะปอ
อำเภอโนนสูง C = บ้านพิมาย อำเภอพิมาย D = บ้านชนาก อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา E = บ้านวังปลัด อำเภอคูเมือง F = หมู่บ้านชาวประมง
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ G = บ้านอ้อตลิ่งชัน อำเภอชุมพลบุรี
H = บ้านพงสวาย อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

การจัดหมวดหมู่	การแพร่กระจาย							
	A	B	C	D	E	F	G	H
Phylum Chordata								
Subphylum Vertebrata								
Class Osteichthyes								
Subclass Actinopterygii								
Order Osteoglossiformes								
Family Notopteridae								
ปลากาย Chitala ornata	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาหลด Notopterus notopterus	+	+	+	+	+	+	+	+
Order Clupeiformes								
Family Clupeidae								
ปลาชีวก้าว Clupeichthys aesapnensis	+	+	+	+	+	+	+	+
Order Cypriniformes								
Family Cyprinidae								
ปลาแปบ Paralaubuca typus	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาแปบ P. riveroi	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาแปบ Oxygaster pointoni	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาแปบ Parachela oxygastroides	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาแปบ P. siamensis	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาแปบหางดอก P. maculicauda	+	+	+	+	+	+	+	+

ตารางที่ 1 (ต่อ)

การจัดหมวดหมู่	การแพร่กระจาย							
	A	B	C	D	E	F	G	H
ปลาชีวนวดยาว <i>Esomus metallicus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาชีวนางแดง <i>Rasbora borapetensis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาชีว <i>R. myersi</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาชีวควาย <i>R. tornieri</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาชีวนางกรรไกรเล็ก <i>R. spilocerca</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาชีวนางกรรไกร <i>R. trilineata</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาเกล็ดถี่ <i>Thynnichthys thynnoides</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาตะโกก <i>Cyclocheilichthys enoplos</i>	-	-	+	+	+	+	+	+
ปลาโกลไหม <i>C. furcatus</i>	-	-	-	+	+	+	+	+
ปลาไส้ตันตาแดง <i>C. apogon</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาไส้ตัน <i>C. lagleri</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาไส้ตันตาขาว <i>C. repasson</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาหางเหลือง <i>Mystacoleucus argenteus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาหนามหลังขาว <i>M. ectypus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาแก้งครีบแดง <i>Puntioplites falcifer</i>	-	-	-	-	-	+	-	+
ปลากะมั่ง <i>P. proctozysron</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาตะเพียนทอง <i>Barbodes altus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาตะเพียนขาว <i>B. gonionotus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลากระแห <i>B. schwanenfeldi</i>	-	-	-	-	-	+	-	+
ปลาตะเพียน <i>Hypsibarbus lagleri</i>	-	-	-	-	+	+	-	+
ปลาตะพาก <i>H. wetmorei</i>	-	-	-	-	-	+	-	+
ปลาแดงน้อย <i>Discherodontus ashmeadi</i>	-	-	-	-	-	+	-	+
ปลาตะเพียนทราย <i>Puntius brevis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาแก้มขี้ <i>Systemus orphoides</i>	+	+	+	+	+	+	+	+

ตารางที่ 1 (ต่อ)

การจัดหมวดหมู่	การแพร่กระจาย							
	A	B	C	D	E	F	G	H
ปลาเลื้อยข้างลาย <i>S. partipentazona</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาสร้อยนกเขา <i>Osteochilus hasselti</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาพรหม <i>O. melanopleura</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาร่องไม้ตับ <i>O. microcephalus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาร่องไม้ตับ <i>O. waandersi</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาเล็บมือนาง <i>Crossocheilus reticulatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	+
ปลาชีวข้างดำ <i>C. siamensis</i>	-	-	-	-	+	+	-	+
ปลากาแดง <i>Epalzeorhynchus frenatum</i>	-	-	-	-	-	-	-	+
ปลาเยือกเทศ <i>Labeo rohita</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลากาดำ <i>Morulius chrysophykadian</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลากะสูบจุด <i>Hampala dispar</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลากะสูบขีด <i>H. macrolepidota</i>	-	-	-	-	+	+	-	+
ปลาสร้อยปีกแดง <i>Henicorhynchus ornatipinnis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาสร้อยหลอด <i>H. lobatus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาสร้อยขาว <i>H. siamensis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาสร้อยลูกกล้วย <i>Labiobarbus siamensis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Family Cobitidae								
ปลารากกล้วย <i>Acanthopsis thiemmethdi</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาหมอขาว <i>Yasuhikotakia modesta</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาหมอคอก <i>Y. morleti</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาหมอข้างลาย <i>Syncrossus helodes</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาอี๊ด <i>Lepidocephalichthys hasselti</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาสาบทอง <i>Pangio anguillaris</i>	+	+	+	+	+	+	+	+

ตารางที่ 1 (ต่อ)

การจัดหมวดหมู่	การแพร่กระจาย							
	A	B	C	D	E	F	G	H
Order Siluriformes								
Family Bagridae								
ปลาแขยงหิน <i>Pseudomystus siamensis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาแขยงธง <i>Heterobagrus bocourti</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาแขยงใบข้าว <i>Mystus singaringan</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาแขยงข้างลาย <i>M. mysticetus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาแขยงข้างลาย <i>M. atrifasciatus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลากดเหลือง <i>Hemibagrus filamentus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลากดแก้ว <i>H. wickioides</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Family Siluridae								
ปลาคางเบื่อน <i>Belodontichthys dinema</i>	-	-	-	-	-	-	-	+
ปลาปีกไก่ <i>Kryptopterus cheveyi</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาขาไก่ <i>K. geminus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาน้ำเงิน <i>Micronema apogon</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาแดง <i>M. bleekeri</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาสุยมพร <i>Ompok krattensis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาเคี้ยวขาว <i>Wallago attu</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Family Schilbeidae								
ปลาสังกะวาดขาว <i>Laides longibarbis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Family Pangasiidae								
ปลาปึก <i>Pangasianodon gigas</i>	-	-	-	-	+	+	+	+
ปลาเผาะ <i>Pangasius conchophilus</i>	-	-	-	-	+	+	-	+
ปลาสรวย <i>P. hypophthalmus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาเทโพ <i>P. larnaudi</i>	+	+	+	+	+	+	+	+

ตารางที่ 1 (ต่อ)

การจัดหมวดหมู่	การแพร่กระจาย							
	A	B	C	D	E	F	G	H
ปลาสังกะวาด <i>P. macronema</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาสังกะวาดท้องคม <i>P. pleurotaenia</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาสวายหนู <i>Helicophagus leptorhynchus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Family Sisoridae								
ปลาแค้ควาย <i>Bagarius yarrelli</i>	-	-	-	-	+	+	+	+
ปลาแค้ติดหิน <i>Glyptothorax lampris</i>	-	-	-	-	+	+	+	+
Family Akysidae								
ปลาขยุย <i>Akysis varius</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Family Clariidae								
ปลาดุกด้าน <i>Clarias batrachus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาดุกอุย <i>C. macrocephalus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Order Beloniformes								
Family Belonidae								
ปลากระทุงเหว <i>Xenentodon cancila</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Family Hemirhamphidae								
ปลาเข็ม <i>Dermogynys siamensis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Order Synbranchiformes								
Family Synbranchidae								
ปลาไหลนา <i>Monopterus albus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Family Mastacembelidae								
ปลาหลด <i>Macrognathus siamensis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาหลดหลังจุด <i>M. semiocellatus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลากระทิง <i>Mastacembelus armatus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+

ตารางที่ 1 (ต่อ)

การจัดหมวดหมู่	การแพร่กระจาย							
	A	B	C	D	E	F	G	H
Order Perciformes								
Family Ambassidae								
ปลาแป้นแก้ว <i>Parambassis siamensis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Family Nandidae								
ปลาหมอช้างเหยียบ <i>Pristolepis fasciatus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาดุมซี <i>Nandus oxyrhynchus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Family Cichlidae								
ปลานิล <i>Oreochromis niloticus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Family Eleotrididae								
ปลาบู่ทราย <i>Oxyeleotris marmoratus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Family Anabantidae								
ปลาหมอ <i>Anabas testudineus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Family Belontiidae								
ปลากริมสี <i>Trichopsis pumila</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลากริมควาย <i>T. vittatus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลากระดี่หม้อ <i>Trichogaster trichopterus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาสลิด <i>T. pectoralis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลากัด <i>Betta smaragdina</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Family Channidae								
ปลาก้าง <i>Channa gachua</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลากระสง <i>C. lucius</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาชะโด <i>C. micropeltes</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาช่อน <i>C. striata</i>	+	+	+	+	+	+	+	+

ตารางที่ 1 (ต่อ)

การจัดหมวดหมู่	การแพร่กระจาย							
	A	B	C	D	E	F	G	H
Order Pleuronectiformes								
Family Soleidae								
ปลาใบไม้ <i>Euryglossa harmandi</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
Order Tetraodontiformes								
Family Tetraodontidae								
ปลาปักเป้า <i>Monotreta leiurus</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาปักเป้าสุวดี <i>M. suvatti</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
ปลาปักเป้าดำ <i>M. fangi</i>	+	+	+	+	+	+	+	+

กราย *Chitala ornata*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Osteoglossiformes

Family Notopteridae

Chitala ornata

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวและมีลักษณะแบนข้างมาก ด้านหลังมีลักษณะโค้งนูน ด้านท้องแคบเป็นสันคม ปากกว้างมาก มุมปากอยู่เลยขอบด้านท้ายของตา ครีบท้องมีขนาดเล็ก ครีบท้องมีขนาดเล็กมาก ครีบก้นยาวมากและเชื่อมต่อกับครีบท้อง เกล็ดมีขนาดเล็กละเอียด ลำตัวมีสีเทาเงิน เนื้อครีบท้องมีจุดสีดำที่ล้อมรอบด้วยสีขาวเรียงกันอยู่ 5 - 10 จุด (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 40 - 100 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาทราย ได้แก่ ยอ มอง เบ็ด ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาทราย *C. ornata* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

สลาด *Notopterus notopterus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Osteoglossiformes

Family Notopteridae

Notopterus notopterus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวและมีลักษณะแบนข้าง ส่วนท้องแคบเป็นสันคมคล้ายกับปลาทราย แต่ส่วนหลังไม่ลาดชันมาก ปากมีขนาดเล็ก มุมปากยาวไม่ถึงขอบด้านท้ายของตา ครีบท้องมีขนาดเล็กและครีบท้องมีขนาดเล็กมาก ครีบก้นยาวมากและเชื่อมต่อกับครีบท้องที่มีขนาดเล็ก ลำตัวมีสีเงิน เทาหรือเทาดำ ไม่มีจุดสีดำที่เนื้อครีบท้อง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 20 - 25 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาสดได้แก่ ยอ มอง เบ็ด ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาสด *N. notopterus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ชีวก้าว *Clupeichthyes aesapnensis*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Clupeiformes

Family Clupeidae

Clupeichthyes aesapnensis

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวและมีลักษณะแบนข้าง ปากมีขนาดเล็ก มุมปากยาวไม่ถึงขอบด้านหน้าของตา เกล็ดบางและหลุดง่าย จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หน้าจุดเริ่มต้นของครีบท้องเล็กน้อย ครีบกันแยกออกจากกันเป็น 2 ส่วน ครีบหางเว้าลึก ลำตัวมีสีเงิน สีเงินอมเหลืองหรือค่อนข้างใส (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 4 - 6 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาชีวก้าว ได้แก่ ยอ สวิง อวนตาถี่

การแพร่กระจาย พบปลาชีวก้าว *C. aesapnensis* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

แปบ *Paralaubuca typus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Paralaubuca typus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวและมีลักษณะแบนข้างมาก ด้านท้องแคบมีลักษณะเป็นสันคม ส่วนหัวและปากมีขนาดเล็ก ตามีขนาดใหญ่ เส้นข้างตัวไม่ต่อเนื่องกัน จุดเริ่มต้นของครีบหลัง อยู่หน้าจุดเริ่มต้นของครีบกัน ครีบอกยาวไม่ถึงครีบท้อง ครีบท้องมีขนาดเล็ก เกล็ดมีขนาดเล็ก บางและหลุดง่าย ครีบหางเว้าลึก ลำตัวมีสีเงินวาว ด้านบนมีสีน้ำเงิน ส่วนหลังมีสีน้ำตาลอม เหลือง ครีบบนมีสีเหลืองอ่อนหรือไม่มีสีโปร่งแสง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแบบ ได้แก่ ยอ มอง แห

การแพร่กระจาย พบปลาแบบ *P. typus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

แบบ *Paralauca riveroi*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Paralauca riveroi

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนข้างมาก ด้านท้องแคบมีลักษณะเป็นสันคม ส่วนหัวและปากมีขนาดเล็ก ตามีขนาดใหญ่ เส้นข้างลำตัวต่อเนื่องกัน จุดเริ่มต้นของครีบหลัง อยู่หน้าจุดเริ่มต้นของครีบกัน ครีบอกยาวถึงเลยครีบท้อง ครีบหางเว้าลึก ลำตัวด้านบนมีสีเหลืองอมเขียว ด้านล่างมีสีขาวยเงิน ครีบนมีสีเทาอ่อน (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 12 - 18 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแบบ ได้แก่ ยอ มอง แห

การแพร่กระจาย พบปลาแบบ *P. riveroi* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

แบบ *Oxygaster pointoni*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Oxygaster pointoni

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนข้างมาก ด้านท้องแคบมีลักษณะเป็นสันคม ส่วนหัวและปากมีขนาดเล็ก ตามีขนาดใหญ่ เกล็ดมีขนาดเล็ก จุดเริ่มต้นของครีบหลัง อยู่หน้าจุดเริ่มต้นของครีบกันเล็กน้อย ครีบหางเว้าลึก ลำตัวด้านบนมีสีเขียวหรือเขียวอมเหลือง ด้านล่างมีสีขาวเงิน ครีบใสหรือมีสีเหลืองอ่อน (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 6 - 8 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแบบ ได้แก่ ยอ มอง แห

การแพร่กระจาย พบปลาแบบ *O. pointoni* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

แบบ *Parachela oxygastroides*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Parachela oxygastroides

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนข้างมาก ด้านท้องแคบมีลักษณะเป็นสันคม ส่วนหัวและปากมีขนาดเล็ก ตามีขนาดใหญ่ จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ตรงกับก้านครีบที่ 3 – 4 ของครีบกัน ครีบอกมีขนาดใหญ่และยาวเลยครีบท้อง มีแถบสีเข้มอยู่บริเวณส่วนต้นของเส้นข้างลำตัว ลำตัวมีสีชาวยเงิน ด้านบนมีสีเขียวอมเหลือง ครีบหลัง ครีบกันและครีบท้องใส บริเวณขอบด้านท้ายครีบหางมีสีดำ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 8 - 12 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแบบ ได้แก่ ยอ มอง แห

การแพร่กระจาย พบปลาแบบ *P. oxygastroides* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

แบบ *Parachela siamensis*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Parachela siamensis

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวและมีลักษณะแบนข้างมาก ด้านท้องแคบมีลักษณะเป็นสันคม ส่วนหัวและปากมีขนาดเล็ก จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ตรงหรืออยู่หน้าจุดเริ่มต้นของครีบกันเล็กน้อย ครีบอกยาวและอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างต่ำ ลำตัวมีสีชาวยเงิน ด้านบนมีสีน้ำตาลหรือสีเขียว ครีบหลัง ครีบกันและครีบท้องใส ครีบหางมีสีเหลือง บริเวณขอบมีสีดำ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 8 - 12 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลากลาย ได้แก่ ยอ มอง แห

การแพร่กระจาย พบปลาแบบ *P. siamensis* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

แปบหางดอก *Parachela maculicauda*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Parachela maculicauda

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวและมีลักษณะแบนข้างมาก ส่วนหัวมีขนาดเล็ก ตามีขนาดใหญ่ ครีบหลังอยู่ค่อนข้างทางด้านท้ายของลำตัว ครีบอกยาวเลยครีบท้อง ครีบท้องมีขนาดเล็ก ลำตัวมีสีเหลืองใส ส่วนท้องสีเงิน ครีบใส ครีบหางมีสีเหลืองและมีแถบสีดำอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่าง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 4 - 6 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแปบหางดอก ได้แก่ ยอ

การแพร่กระจาย พบปลาแปบหางดอก *P. maculicauda* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ชีวนวดยาว *Esomus metallicus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Esomus metallicus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวและมีลักษณะแบนข้างเล็กน้อย ด้านบนของส่วนหัวและหลังมีลักษณะแบนราบมาจนถึงส่วนหน้าของครีบหลัง มีหนวด 2 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงปลายครีบท้อง เกล็ดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ครีบอกมีขนาดใหญ่ ครีบหลังอยู่ค่อนข้างไปทางด้านท้ายของลำตัว ครีบหางเว้าลึก ลำตัวมีสีชาเงิน หรือสีเหลืองทอง มีแถบสีดำพาดยาวจากส่วนท้ายของตา ผ่านกลางลำตัวไปจนถึงโคนหาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 5 - 7 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาชนิดยาว ได้แก่ ยอ สวิง

การแพร่กระจาย พบปลาชนิดยาว *E. metallicus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ชีวกางแดง *Rasbora borapetensis*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Rasbora borapetensis

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนข้างเล็กน้อย ปากมีขนาดเล็ก จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ตรงข้ามกับส่วนท้ายสุดของฐานครีบท้อง ครีบอกอยู่ในระดับต่ำ ลำตัวมีสีเหลืองหรือสีเหลืองทอง ส่วนท้องมีสีเงิน มีแถบสีดำพาดยาวตลอดลำตัวจากเหงือกไปจนถึงโคนหาง ครีบใส บริเวณโคนครีบกางมีสีแดงสด (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาชีวกางแดง ได้แก่ ยอ สวิง อวนตาถี่

การแพร่กระจาย พบปลาชีวกางแดง *R. borapetensis* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ฉิว *Rasbora myersi*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Rasbora myersi

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวและมีลักษณะแบนข้างเล็กน้อย ปากอยู่ทางด้านหน้าของส่วนหัว ปากมีขนาดเล็ก ตามีขนาดใหญ่ ไม่มีหนวด จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่บริเวณกึ่งกลางลำตัว ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีขาวยเงินทางด้านล่าง ทางด้านบนมีสีเขียวหรือสีเทา ครีบใสหรือมีสีเทาจาง ส่วนท้ายของครีบหางมีสีเทาเข้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 7 - 10 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาฉิว ได้แก่ ยอ มอญ แห

การแพร่กระจาย พบปลาฉิว *R. myersi* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ฉิวควาย *Rasbora tornieri*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Rasbora tornieri

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวและมีลักษณะแบนข้างเล็กน้อย ปากอยู่ทางด้านหน้าของส่วนหัว ไม่มีหนวด ตามีขนาดใหญ่ เกล็ดมีขนาดใหญ่ ครีบหลังอยู่ค่อนข้างไปทางด้านท้ายของลำตัวเล็กน้อย ขอบด้านท้ายของครีบกันเว้าเข้าไปเล็กน้อย ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเหลืองอ่อน ด้านท้องมีสีขาว ครีบใสหรือมีสีเหลือง ครีบหางมีสีเหลือง แต่บริเวณขอบมีสีดำ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 6 - 10 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาชนิดนี้ ได้แก่ ยอ มอญ แห

การแพร่กระจาย พบปลาชนิดนี้ *R. tornieri* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ชีวทางกรรไกรเล็ก *Rasbona spilocerca*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Rasbona spilocerca

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้างเล็กน้อย ส่วนหัวมีขนาดค่อนข้างเล็ก ตามีขนาดใหญ่ จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ถัดจากจุดเริ่มต้นของครีบท้องไปเล็กน้อย ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวด้านบนมีสีเหลืองอ่อน ด้านท้องมีสีขาวเงิน ครีบใส มีแถบสีดำที่ส่วนบนของครีบหลังส่วนโคนของครีบหาง และที่ส่วนท้ายของครีบหางทั้งด้านบนและด้านล่าง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาชนิดนี้ ได้แก่ ยอ อวนตาถี่

การแพร่กระจาย พบปลาชนิดนี้ *R. spilocerca* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ชีวทางกรรไกร *Rasbona trilineata*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Rasbona trilineata

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนข้างเล็กน้อย ส่วนหัวมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ตามีขนาดใหญ่ จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ถัดจากจุดเริ่มต้นของครีบท้องไปเล็กน้อย ขอบด้านท้ายของครีบหลังและครีบกันมีลักษณะเว้าเข้าไปเล็กน้อย ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเหลืองอ่อน ส่วนหัวและท้องสีเงิน ครีบใส ส่วนท้ายของครีบหางมีแถบสีดำทั้งด้านบนและด้านล่าง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 5 - 8 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาชีวทางกรรไกร ได้แก่ ยอ อวนตาถี่

การแพร่กระจาย พบปลาชีวทางกรรไกร *R. trilineata* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

เกล็ดถี่ *Thynnichthys thynnoides*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Thynnichthys thynnoides

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนข้างเล็กน้อย ส่วนหัวและตามีขนาดใหญ่ ปากมีขนาดเล็ก ไม่มีหนวด เกล็ดมีขนาดเล็ก ส่วนปลายของครีบท้อง ครีบหลังและครีบก้นมีลักษณะเว้าเข้าไปเล็กน้อย จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หน้าจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีขาวยเงิน ด้านหลังมีสีเข้ม ด้านข้างและด้านท้องมีสีเงินวาว บริเวณด้านท้ายของเหงือกทางส่วนบนเหนือครีบอกมีแถบสีดำ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 12 - 20 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาเกล็ดดี ได้แก่ ยอ มอง

การแพร่กระจาย พบปลาเกล็ดดี *T. thynnoides* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ตะโกก *Cyclocheilichthys enoplos*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Cyclocheilichthys enoplos

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีลักษณะเรียวแหลมและมีหนวด 2 คู่ ปากมีขนาดเล็ก เกล็ดมีขนาดใหญ่ ครีบหลังยกสูง อยู่กึ่งกลางระหว่างปลายปากกับฐานของครีบหาง ครีบต่าง ๆ มีสีเทาจาง ครีบหลังและครีบหางมีจุดสีดำขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปก้านครีบอันแรกมีขนาดใหญ่และมีหยักที่ขอบด้านท้าย ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเงิน อมชมพูอ่อน หรือสีฟ้าอ่อน ส่วนท้องมีสีขาว (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 30 - 60 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาตะโกก ได้แก่ ยอ มอง แห

การแพร่กระจาย พบปลาตะโกก *C. enoplos* ในบริเวณบ้านพิมาย อำเภอพิมาย บ้านขนาก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา บ้านวังปลัด อำเภอคูเมือง หมู่บ้านชาวประมง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านอ้อตลิ่งชัน อำเภอชุมพลบุรี บ้านพงสวาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุรินทร์

โงกไหม *Cyclocheilichthys furcatus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Cyclocheilichthys furcatus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง คล้ายปลาตะกอก แต่ลำตัวบวมกว้างมากกว่า มีหนวด 2 คู่ ปากมีขนาดเล็ก เกิดในแนวเส้นข้างลำตัวมีลายเป็นแฉก และมีจำนวน 36 - 38 แถว ครีบหลังยกสูง ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเงิน ครีบบนมีสีจางหรือสีเหลืองอ่อน (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 40 - 80 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาโงกไหม ได้แก่ ยอ มอ ง แห

การแพร่กระจาย พบปลาตะโงกไหม *C. furcatus* ในบริเวณบ้านชนาก อำเภอยะรัง จังหวัดนครราชสีมา บ้านวังปลัด อำเภอยะรัง หมู่บ้านชาวประมง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านอ้อดลิ้งชัน อำเภอยะรังบุรี บ้านพงสวาย อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ไส้ตันตาแดง *Cyclocheilichthys apogon*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Cyclocheilichthys apogon

รูปร่างลักษณะ ลำตัวมีลักษณะแบนข้าง ส่วนหัวและปากมีขนาดเล็ก ไม่มีหนวด ขอบตา ด้านบนมีสีแดง เกล็ดมีขนาดเล็ก ขอบของเกล็ดมีสีดำติดต่อกันตลอดความยาวของลำตัว ครีบท้องมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวด้านบนมีสีเข้ม ด้านข้างมีสีเงินหรือสีน้ำตาลอ่อน มีแถบสีเข้มพาดตามความยาวของลำตัว จำนวน 7 - 9 แถบ บริเวณโคนหางมีจุดสีดำ ครีบท้องมีสีแดงเรื่อ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาได้ต้นตาแดง ได้แก่ ยอ มอ ง แห

การแพร่กระจาย พบปลาได้ต้นตาแดง *C. apogon* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ไส้ตัน *Cyclocheilichthys lagleri*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Cyclocheilichthys lagleri

รูปร่างลักษณะ ลำตัวมีลักษณะแบนข้าง ส่วนหัวและปากมีขนาดเล็ก คล้ายปลาไส้ตันตาแดง ไม่มีหนวด เกล็ดมีขนาดเล็ก จำนวนเกล็ดรอบคอดหางมี 20 แถว ครีบท้องมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเทาเงิน หรือสีเทาอ่อน ครีบท้องมีสีเทาอ่อน มีลักษณะโปร่งแสง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 10 - 13 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาไส้ตัน ได้แก่ ยอ มอ ง แห

การแพร่กระจาย พบปลาไส้ตัน *C. lagleri* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ไส้ตันตาขาว *Cyclocheilichthys repasson*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Cyclocheilichthys repasson

รูปร่างลักษณะ ลำตัวมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับปลาไส้ตันตาแดง แต่ขอบตาด้านบนไม่มีสีแดง มีหนวดสั้น 2 คู่ ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเงิน ด้านบนมีสีเข้ม ส่วนด้านท้องมีสีขาว มีแถบสีเข้มพาดตามความยาวของลำตัว 5 - 6 แถบ ครีบมีสีชมพูเหลืองหรือสีเทาจาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาไส้ตันตาขาว ได้แก่ ยอ มอญ แห

การแพร่กระจาย พบปลาไส้ตันตาขาว *C. repasson* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

หางเหลือง *Mystacoleucus argenteus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Mystacoleucus argenteus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวมีลักษณะแบนบาง ส่วนหัวและปากมีขนาดเล็ก มีหนวด 2 คู่ ก้านครีบลักษณะหยักด้านท้าย ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเงินวาว ส่วนท้องมีสีขาว ครีบหลังมีสีส้ม ขอบด้านบนและด้านท้ายมีสีดำ ครีบอื่น ๆ มีสีเหลือง บริเวณขอบด้านบนและด้านท้ายของครีบหางมีสีดำ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาหางเหลือง ได้แก่ ยอ มอง แห

การแพร่กระจาย พบปลาหางเหลือง *M. argenteus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

นามหลังขาว *Mystacoleucus ectypus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Mystacoleucus ectypus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวมีลักษณะแบนบาง ปากมีขนาดเล็ก ไม่มีหนวด ก้านครีบแข็งของครีบหลังมีลักษณะหยักเป็นฟันเลื่อย มีเกล็ดตามแนวเส้นข้างลำตัว จำนวน 42 - 46 เกล็ด ครีบบางมีลักษณะเว้าลึก ส่วนหัวและลำตัวมีสีเงินอมเหลือง ด้านล่างและส่วนท้องมีสีเทาจาง ครีบอกหรือมีสีเทาจาง ส่วนปลายด้านบนของครีบหลังมีสีดำ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 6 - 8 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาหนามหลังขาว ได้แก่ ยอ มอง แห

การแพร่กระจาย พบปลาหนามหลังขาว *M. ectypus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

แก้งครีบบแดง *Puntioplites falcifer*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Puntioplites falcifer

รูปร่างลักษณะ ลำตัวกว้างสั้นและมีลักษณะแบนข้างมาก ตามีขนาดใหญ่ ปากมีขนาดเล็กและทุ่ ไม่มีหนวด มีเกล็ดรอบคอดหาง จำนวน 16 เกล็ด ก้านครีบบ้างของครีบหลังยาวและมีลักษณะหยักเป็นฟันเลื่อย ก้านครีบบ้างของครีบก้นมีขนาดใหญ่และมีลักษณะหยักเป็นฟันเลื่อย ส่วนหัวและลำตัวมีสีเงิน ครีบหลัง ครีบก้นและครีบบ้างมีสีส้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 15 - 35 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแก้งครีบบ้าง ได้แก่ ยอ มอง แห

การแพร่กระจาย พบปลาแก้งครีบบ้าง *P. falcifer* ในบริเวณ หมู่บ้านชาวประมง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านพงสวาย อำเภอนาหว้า จังหวัดสุรินทร์

กะมั่ง *Puntioplites proctoysron*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Puntioplites proctoysron

รูปร่างลักษณะ ลำตัวสั้นกว้างและมีลักษณะแบนข้าง ตามีขนาดใหญ่ ปากเล็กทู่ ไม่มี
หนวด จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หลังจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ครีบกันมีลักษณะเว้าเข้าไป ก้านครีบ
แข็งของครีบกันมีขนาดใหญ่และขอบด้านท้ายมีลักษณะเป็นหยัก ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัว
มีสีเงินวาว ครีบอกมีสีเหลือง ครีบท้องมีสีส้ม ครีบหลัง ครีบกันและครีบหางมีสีเทา ขอบด้านท้าย
มีสีเทาดำ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 10 - 25 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลากะมัง ได้แก่ ยอ มอง ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลากะมัง *P. proctozyson* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ตะเพียนทอง *Barbodes altus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Barbodes altus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีขนาดเล็ก ตามีขนาดใหญ่
มีหนวด 2 คู่ จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หลังจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ส่วนปลายครีบท้องมีลักษณะ
เรียวแหลมครีบอกยาวถึงจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ขอบของครีบกันมีลักษณะเว้าเข้าไป ครีบหางมี
ลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเงินหรือสีเหลืองทอง ด้านบนมีสีเข้มกว่าด้านล่าง ครีบท้อง ครีบกันและ
ครีบหางมีสีเหลืองส้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 15 - 25 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาตะเพียนทอง ได้แก่ ยอ มอง แห

การแพร่กระจาย พบปลาตะเพียนทอง *B. altus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ตะเพียนขาว *Barbodes gonionotus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Barbodes gonionotus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ปากอยู่ตรงปลายสุดด้านหน้าของส่วนหัว มีหนวด 2 คู่ จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หลังจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ขอบด้านท้ายของครีบหลังและครีบกันมีลักษณะเว้าเข้าไปเล็กน้อย ครีบท้องยาวถึงรูก้น ครีบหางมีลักษณะหยักลึก ลำตัวมีสีขาวยเงิน ด้านบนมีสีเข้ม ด้านท้องมีสีจาง ครีบหลังและครีบหางมีสีเทาหรือสีเทาอมเหลือง ครีบอื่น ๆ มีสีเหลืองหรือสีส้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 15 - 35 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาตะเพียนขาว ได้แก่ ยอ มอญ เบ็ด ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาตะเพียนขาว *B. gonionotus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

กระแห *Barbodes schwanenfeldi*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Barbodes schwanenfeldi

รูปร่างลักษณะ ลำตัวมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวและปากมีขนาดเล็ก มีหนวด 2 คู่ เกิดมีขนาดเล็ก จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หลังจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ขอบด้านท้ายของครีบ ก้นมีลักษณะเว้าเข้าไป ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเงินวาวหรือสีเหลืองทอง ครีบหลังมีสี ส้มและมีส่วนปลายด้านบนเป็นสีดำ ครีบอกมีสีเหลือง ครีบท้อง ครีบก้นและครีบหางมีสีส้ม ขอบ ด้านบนและด้านล่างของครีบหางมีสีดำ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 15 - 30 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลากระแห ได้แก่ ยอ มอญ ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลากระแห *B. schwanenfeldi* ในบริเวณ หมู่บ้านชาวประมง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านพงสวายอำเภอนาทม จังหวัดสุรินทร์

ตะเพียน *Hypsibarbus lagleri*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Hypsibarbus lagleri

รูปร่างลักษณะ ลำตัวมีลักษณะเรียวยาวและแบนทางด้านข้าง ก้านครีบแข็งของครีบหลัง หยักเป็นฟันเลื่อย ฐานครีบก้นสั้น มีความยาวประมาณร้อยละ 60 ของความยาวของส่วนหัว มีเกล็ดที่อยู่ระหว่างจุดเริ่มต้นของฐานครีบหลังกับเส้นข้างลำตัว จำนวน 5 แถว ลำตัวมีสีขาวยเงิน ทางด้านล่าง ด้านบนมีสีเทา ครีบมีสีเทาอ่อนและมีลักษณะโปร่งแสง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 25 - 40 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาตะเพียน ได้แก่ ยอ มอญ ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาตะเพียน *H. lagleri* ในบริเวณบ้านวังปลัด อำเภอกุเมือง หมู่บ้านชาวประมง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านพงสวาย อำเภอนาทม จังหวัดสุรินทร์

ตะพาก *Hypsibarbus wetmorei*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Hypsibarbus wetmorei

รูปร่างลักษณะ ลำตัวมีลักษณะเรียวยาวและแบนทางด้านข้าง มีหนวด 2 คู่ เกล็ดมีขนาดใหญ่ ก้านครีบแข็งของครีบหลังหยักเป็นฟันเลื่อย จำนวน 9 - 14 ซี่ ลำตัวมีสีเงินปนเหลือง ครีบบีสีเหลืองหรือชมพู ครีบท้องและครีบกันมีสีแดงหรือส้มแดง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 25 - 40 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาตะพาก ได้แก่ ยอ มอง แห

การแพร่กระจาย พบปลาตะพาก *H. wetmorei* ในบริเวณ หมู่บ้านชาวประมง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านพงสวาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุรินทร์

แดงน้อย (หางแดง) *Discherodontus ashmeadi*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Discherodontus ashmeadi

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้างเล็กน้อย ปากมีขนาดเล็ก เกือบเล็ก ก้านครีบแข็งของครีบหลังหยักเป็นฟันเลื่อย ก้านครีบของครีบท้องมีจำนวน 8 อัน ลำตัวทางด้านล่างมีสีขาวยเงิน ด้านบนมีสีเขียวอมเหลือง ที่ส่วนปลายของครีบหลังมีแถบสีดำขนาดใหญ่ ครีบอก ครีบท้องและครีบก้นมีสีขาวยใส ครีบหางมีสีแดง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 8 - 10 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแดงน้อย ได้แก่ ยอ มอญ แห

การแพร่กระจาย พบปลาแดงน้อย *D. ashmeadi* ในบริเวณ หมู่บ้านชาวประมง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านพงสวาย อำเภอนาหว้า จังหวัดสุรินทร์

ตะเพียนทราย *Puntius brevis*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Puntius brevis

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวและปากมีขนาดเล็ก มีหนวด 1 คู่ ที่ขากรรไกรบนบริเวณมุมปาก จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หลังจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ขอบด้านท้ายของครีบท้องและครีบก้นมีลักษณะตรง ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเข้ม ด้านท้องมีสีขาวยเงินวาว บริเวณคอคอดหางมีจุดสีน้ำตาลดำ ครีบอกใส ครีบท้องและครีบก้นมีสีเหลืองส้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 6 - 10 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาตะเพียนทราย ได้แก่ ยอ มอญ ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาตะเพียนทราย *P. brevis* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

แก้มขี้ *Systemus orphoides*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Systemus orphoides

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ปากยื่นแหลมไปทางด้านหน้า มีหนวด 2 คู่ จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ถัดจากจุดเริ่มต้นของครีบท้องไปทางด้านหลังเล็กน้อย ครีบอกยาวไม่ถึงครีบท้อง และครีบท้องยาวไม่ถึงครีบกัน ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีขาวยเงิน ด้านบนมีสีเข้มกว่าทางด้านล่าง ส่วนแก้มมีสีแดงหรือสีส้ม ด้านท้ายของช่องเหงือกมีสีดำ ครีบบมีสีแดงหรือสีส้ม ขอบด้านบนและด้านล่างของครีบหางมีสีดำ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 12 - 20 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแก้มขี้ ได้แก่ ยอ มอง ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาแก้มขี้ *S. orphoides* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

เสือข้างลาย *Systemus partipenrazona*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Systemus partipentazona

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวรี ส่วนหัวและตามีขนาดใหญ่ ปากมีขนาดเล็ก จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หลังจุดเริ่มต้นของครีบท้องเล็กน้อย ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวด้านบนมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อน ด้านท้องเป็นสีขาวเงิน มีแถบสีดำพาดขวางลำตัวละครีบหลัง 4 - 5 แถบ ด้านบนของครีบหลังมีสีแดง ครีบท้องและครีบกันมีสีเหลือง ครีบอกและครีบหางใส (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาเสือข้างลาย ได้แก่ ยอ สวิง แห

การแพร่กระจาย พบปลาเสือข้างลาย *S. partipentazona* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

สร้อยนกเขา *Osteochilus hasselti*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Osteochilus hasselti

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้างเล็กน้อย ส่วนหัวเล็กสันมีหนวด 2 คู่ เกล็ดมีขนาดใหญ่ จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่น้ำจุดเริ่มต้นของครีบท้องเล็กน้อย เส้นข้างลำตัวสมบูรณ์ ฐานครีบหลังยาว ขอบด้านท้ายของครีบกันมีลักษณะตัดตรง ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีน้ำตาลหรือสีเทา ด้านข้างลำตัวมีแถบสีเข้มตามความยาว 5 - 8 แถบ บริเวณโคนหางมีจุดสีดำขนาดใหญ่ ครีบอกมีสีเข้ม ส่วนครีบอื่น ๆ มีสีส้มหรือสีน้ำตาลแดง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 12 - 25 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาสร้อยนกเขา ได้แก่ ยอ มอญ ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาสร้อยนกเขา *O. hasselti* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

พรม *Osteochilus melanopleura*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Osteochilus melanopleura

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ ปากมีลักษณะทุ้มและเขี้ยวขึ้นด้านบน มีหนวด 2 คู่ ตามีสีแดง เกล็ดมีขนาดเล็ก มีแถบสีดำในแนวตั้งอยู่บริเวณเหนือครีบอกฐานครีบลึงยาว ครีบท้องมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเทาดำหรือสีน้ำตาล ด้านท้องมีสีจาง ครีบลึงและครีบท้องมีสีเทาดำ ครีบท้องมีสีเทาจาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 20 - 40 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาพรม ได้แก่ ยอ มอง ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาพรม *O. melanopleura* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ร่อนไม้ตับ *Osteochilus microcephalus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Osteochilus microcephalus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ก้านครีบแข็งของครีบหลังเรียบ ไม่มีหนามและยื่นยาว ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ส่วนหัวและลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลปนชมพู และมีแถบสีเข้มพาดเป็นแนวยาวบริเวณกลางลำตัวจนถึงฐานครีบหาง ด้านท้องมีสีจาง ครีบบีสีน้ำตาลแดง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 15 - 24 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาร่องไม้ตัก ได้แก่ ยอ มอง ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาร่องไม้ตัก *O. microcephalus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ร่องไม้ตัก *Osteochilus waandersi*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Osteochilus waandersi

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้างเล็กน้อย มีหนวด 2 คู่ จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หน้าจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ก้านครีบแข็งของครีบหลังเรียบ ไม่มีหนามและมักยื่นยาว ความยาวของครีบอกไม่ถึงจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีชมพู และมีแถบสีดำพาดเป็นแนวยาวบริเวณกลางลำตัวจากส่วนหัวจนถึงปลายสุดของครีบหาง ด้านท้องมีสีจาง ครีบบีสีน้ำตาลแดงโปร่งแสง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 12 - 18 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาข้างลาย ได้แก่ ยอ มอง ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาข้างลาย *O. waandersi* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

เล็บมือนาง *Crossocheilus reticulatus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Crossocheilus reticulatus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีลักษณะเรียวเล็ก ปากมีขนาดเล็กและอยู่ทางด้านล่างของส่วนหัว มีหนวดสั้น 1 คู่ ครีบหลังมีก้านครีบที่แตกแขนง จำนวน 8 อัน ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเขียวอมฟ้าทางด้านบน ด้านล่างมีสีเงิน ขอบเกล็ดมีสีดำ ทำให้ดูคล้ายเป็นร่างแห ที่บริเวณคออดหางมีจุดสีดำขนาดใหญ่ ลักษณะกลมรีคล้ายรูปไข่ ครีบบนมีสีเทาอ่อนโปร่งแสง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 8 - 12 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาเล็บมือนาง ได้แก่ ยอ แห

การแพร่กระจาย พบปลาเล็บมือนาง *C. reticulatus* ในบริเวณบ้านพงสวาย อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ชีข้างดำ *Crossocheilus siamensis*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Crossocheilus siamensis

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีลักษณะเรียวเล็ก ปากมีขนาดเล็กและอยู่ทางด้านล่าง มีหนวดสั้น 1 คู่ ก้านครีบแข็งของครีบหลังเรียบ ครีบหลังมีก้านครีบที่แตกแขนง จำนวน 8 ก้าน เกล็ดมีขนาดเล็ก ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง และมีแถบสีเข้มหรือสีดำพาดยาวจากส่วนหัวถึงครีบหาง ครีบบีสีเทาจนหรือสีเหลืองอ่อน (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 8 -15 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาชิวข้างดำ ได้แก่ ยอ แห

การแพร่กระจาย พบปลาชิวข้างดำ *C. siamensis* ในบริเวณบ้านวังปลัด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านพงสวาย อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

กาแดง *Epalzeorhynchus frenatum*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Epalzeorhynchus frenatum

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีลักษณะเรียวเล็ก ปากมีขนาดเล็กและอยู่ทางด้านล่าง มีหนวดสั้น 2 คู่ ก้านครีบแข็งของครีบหลังเรียบ ครีบหลังมีก้านครีบที่แตกแขนง จำนวน 10 - 11 ก้าน ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงหรือสีดำ ครีบบีสีแดงและมีจุดสีดำเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 8 - 12 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแดง ได้แก่ ยอ ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาแดง *E. frenatum* ในบริเวณ บ้านพงสวาย อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ยี่สกเทศ *Labeo rohita*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Labeo rohita

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้างเล็กน้อย ตามีสีแดง ปากมีขนาดเล็กและอยู่ค่อนข้างต่ำทางด้านล่างของส่วนหัว ริมฝีปากหนา จะงอยปากแบน และยื่นยาวเลยปากออกไป จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ใกล้จะงอยปากมากกว่าครีบหางและอยู่หน้าจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ครีบท้องยาวไม่ถึงรูก้น ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ด้านบนของลำตัวมีสีน้ำตาลเงินและมีแต้มสีแดงในแต่ละเกล็ด ด้านท้องมีสีขาว ครีบบีสีดำนหรือสีเทา (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 50 - 80 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลายี่สกเทศ ได้แก่ ยอ มอญ เบ็ด แห

การแพร่กระจาย พบปลายี่สกเทศ *L. rohita* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

กาดำ *Morulus chrysophykadian*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Morulus chrysophykadian

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ด้านบนของลำตัวมีลักษณะโค้งสูง มีหนวด 2 คู่ จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หน้าจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ฐานของครีบหลังยาว ครีบอกยาวถึงจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ปลาของครีบกันมีลักษณะเรียวแหลม ขอบด้านบนอกเว้าเข้าไปเล็กน้อย ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวและครีบบีสีดำน ด้านบนของลำตัวมีสีเข้มกว่าทางด้านล่าง ส่วนหัวและท้องมีสีจาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลากาดำ ได้แก่ ยอ มอง เบ็ด แห

การแพร่กระจาย พบปลากาดำ *M. chrysophykadian* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

กระสับจุด *Hampala dispar*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Hampala dispar

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ ปากกว้างและยื่นไปทางด้านหน้า มีหนวด 1 คู่ ที่ขากรรไกรบน จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ถัดจากจุดเริ่มต้นของครีบท้องเล็กน้อย ครีบอกยาวไม่ถึงจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีชาเงิน กลางลำตัวบริเวณใต้ครีบหลังมีจุดสีดำ 1 จุด ครีบบีสีแดงเรื่อ ขอบด้านบนและด้านล่างของครีบหางมีสีเข้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 20 - 35 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลากระสับจุด ได้แก่ ยอ มอง เบ็ด แห

การแพร่กระจาย พบปลากระสับจุด *H. dispar* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

กระสับซิด *Hampala macrolepidota*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Hampala macrolepidota

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ ปากกว้างและยื่นไปทางด้านหน้า มีหนวด 1 คู่ ที่ขากรรไกรบน จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ถัดจากจุดเริ่มต้นของครีบท้องเล็กน้อย ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีชาวเงิน ด้านบนมีสีเข้มกว่าด้านล่าง ที่บริเวณกลางลำตัวจากจุดเริ่มต้นของครีบหลังมีแถบสีดำพาดลงมาตามแนวดิ่ง ครีบหางมีสีแดงบริเวณขอบด้านบนและด้านล่างมีสีดำ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 30 - 60 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลากระสับซิด ได้แก่ ยอ มอญ เบ็ด แห

การแพร่กระจาย พบปลากระสับซิด *H. macrolepidota* ในบริเวณบ้านวังปลัด อำเภอดุเมือง หมู่บ้านชาวประมง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านพงสวาย อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

สร้อยปีกแดง *Henicorhynchus ornatipinnis*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Henicorhynchus ornatipinnis

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาว ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ ปากมีลักษณะโค้งมน และไม่ยื่นยาวไปทางด้านหน้า เกล็ดมีขนาดใหญ่ จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่เยื้องไปทางด้านหน้า จุดเริ่มต้นของครีบท้องเล็กน้อย ครีบหางมีลักษณะเว้าตื้น ลำตัวมีสีเงินอมเหลือง ครีบอก ครีบท้องและครีบก้น มีสีส้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 8 - 12 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาสร้อยปีกแดง ได้แก่ ยอ มอง ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาสร้อยปีกแดง *H. ornatipinnis* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

สร้อยหลอด *Henicorhynchus lobatus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Henicorhynchus lobatus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาว ส่วนหัวและปากมีขนาดเล็ก ไม่มีหนวด ก้านครีบแข็งของครีบหลังเรียบ ครีบหลังประกอบด้วยก้านครีบที่แตกแขนงจำนวน 8 อัน ลำตัวมีสีเงิน ครีบบนมีสีเทา สีหรือสีเหลืองอ่อน บริเวณปลายครีบบนมีสีชมพู (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาสร้อยหลอด ได้แก่ ยอ มอง ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาสร้อยหลอด *H. lobatus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

สร้อยขาว *Henicorhynchus siamensis*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Henicorhynchus siamensis

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ ปากเล็กและยื่นยาวออกไปทางด้านหน้า เกล็ดมีขนาดใหญ่ ส่วนท้ายของครีบหลัง ครีบท้องและครีบกันมีลักษณะเว้าเข้าไป ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเงินอมเทา ด้านบนมีสีเข้ม ด้านท้องมีสีขาวเงิน ครีบใส หรือมีสีเทาหรือสีเหลืองจาง ๆ ขอบด้านท้ายของครีบหลังมีแถบสีเข้ม(ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 10 - 18 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาสร้อยขาว ได้แก่ ยอ มอญ ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาสร้อยขาว *H. siamensis* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

สร้อยลูกกล้วย *Labiobarbus siamensis*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cyprinidae

Labiobarbus siamensis

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีขนาดเล็ก ปากมีขนาดเล็ก เกล็ดมีขนาดเล็ก มีหนวดยาว 2 คู่ ฐานของครีบหลังยาวมาก เนื้อครีบอกมีแถบสีดำพาดในแนวตั้ง ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเงินวาว มีแถบสีเข้มพาดตามแนวยาว 5 - 6 แถบ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาสร้อยลูกกล้วย ได้แก่ ยอ มอง ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาสร้อยลูกกล้วย *L. siamensis* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

รากกล้วย *Acanthopsis thiemmethdi*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cobitidae

Acanthopsis thiemmethdi

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาว ส่วนหัวเรียวแหลมไปทางด้านหน้าและมีลักษณะแบนทางด้านข้างเล็กน้อย ปากมีขนาดเล็ก ตามีขนาดเล็กและอยู่ค่อนข้างด้านบนของส่วนหัว มีหนวด 3 คู่ บริเวณใต้ตามีหนามแหลม จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หน้าจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ครีบหางมีลักษณะเว้าตื้น ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีขาวอมเทา และมีแถบสีเข้มเป็นดวงตลอดความยาวของลำตัวทางด้านบน ด้านท้องมีสีจาง ครีบใสหรือมีสีเทาจาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 8 - 16 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลารากกล้วย ได้แก่ ยอ มอง สวิง

การแพร่กระจาย พบปลารากกล้วย *A. thiemmethdi* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

หมูขาว (หมูมัน) *Yasuhikotakia modesta*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cobitidae

Yasuhikotakia modesta

รูปร่างลักษณะ ลำตัวค่อนข้างยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวและจะงอยปากยื่นยาวออกไปทางด้านหน้า ตามีขนาดเล็กและอยู่ค่อนข้างด้านบนของส่วนหัว บริเวณใต้ตามีหนามโค้งเรียวยาวแหลมฝังอยู่ในร่องรูปพระจันทร์เสี้ยว ปากอยู่ค่อนข้างต่ำทางด้านล่างของส่วนหัวเล็กน้อย มีหนวด 3 คู่ ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเขียวอมเหลือง ด้านบนมีสีเข้มกว่าทางด้านล่าง มีแถบสีดำอยู่บริเวณโคนครีบหาง ครีบหลัง ครีบก้นและครีบหางมีสีเหลืองส้ม ครีบออก และครีบท้องมีสีเหลืองจาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาหมูขาว ได้แก่ มอญ ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาหมูขาว (หมูมัน) *Y. Modesta* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

หมูคอก (หมูหลังถนน) *Yasuhikotakia morleti*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cobitidae

Yasuhikotakia morleti

รูปร่างลักษณะ ลำตัวป้อมสั้นและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ด้านหลังมีลักษณะโค้งสูง จะงอยปากสั้นๆ ตามีขนาดเล็กและอยู่ค่อนข้างทางด้านบนของส่วนหัว บริเวณใต้ตามีหนามโค้ง เรียวแหลมฝังอยู่ในร่องรูปพระจันทร์เสี้ยว ปากอยู่ค่อนข้างมาทางด้านล่าง ริมฝีปากบนยื่นเลย ริมฝีปากล่างเล็กน้อย มีหนวด 3 คู่ ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเหลืองหรือสีส้ม ด้านท้องมีสีจาง มีแถบสีดำพาดอยู่กลางหลังตลอดความยาวตั้งแต่จะงอยปากจนถึงโคนหาง และบริเวณคอคอดหางมีแถบสีดำตามแนวขวาง ครีบใส มีสีเหลือง น้ำตาลหรือสีส้มจาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 4 - 8 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาหมูกอก ได้แก่ มอง ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาหมูกอก *Y. morleti* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

หมูข้างลาย *Syncrossus helodes*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cobitidae

Syncrossus helodes

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวและจะงอยปาก ยื่นยาวออกไปทางด้านหน้า ตามีขนาดเล็กและอยู่ค่อนข้างทางด้านบนของส่วนหัว บริเวณใต้ตามี หนามโค้งเรียวแหลมฝังอยู่ในร่องรูปพระจันทร์เสี้ยว ปากมีขนาดเล็ก มีหนวดสั้น 3 คู่ จุดเริ่มต้น ของครีบหลังอยู่หน้าจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนหรือ สีเขียวอมเหลือง ด้านท้องมีสีจาง ด้านข้างลำตัวมีแถบสีเข้มพาดตามแนวขวาง ครีบหลังและครีบ หางมีสีเข้ม ครีบอก ครีบท้องและครีบกันใสหรือมีสีเหลืองส้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาหมูข้างลาย ได้แก่ มอง ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาหมูข้างลาย *S. helodes* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

อี๊ด *Lepidocephalichthys hasselti*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cobitidae

Lepidocephalichthys hasselti

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาวและแบนทางด้านข้างเล็กน้อย ส่วนหัวสั้นตามีขนาดเล็กอยู่ค่อนไปทางด้านบนของส่วนหัว บริเวณใต้ตามีหนามแหลมโค้ง 1 คู่ เกิดมีขนาดเล็ก ครีบหางมีลักษณะกลมมน ลำตัวมีสีเหลืองอมน้ำตาล และมีแถบหรือจุดสีเข้มพาดตามแนวยาวบริเวณกลางลำตัวทางด้านข้างจากส่วนหัวไปจนถึงโคนหาง ครีบใสและมีจุดสีน้ำตาลหรือสีดำกระจายทั่วไป (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 4 - 6 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาอี๊ด ได้แก่ สวิง

การแพร่กระจาย พบปลาอี๊ด *L. hasselti* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

สายทอง *Pangio anguillaris*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Cypriniformes

Family Cobitidae

Pangio anguillaris

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาวคล้ายกับปลาไหล ส่วนหัวมีขนาดเล็ก ตา มีขนาดเล็กมาก บริเวณใต้ตามีหนามแหลม มีหนวด 3 คู่ ครีบหลัง ครีบท้องและครีบกันอยู่ค่อนข้างไปทางด้านท้ายของลำตัว จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หน้าจุดเริ่มต้นของครีบกัน ปลายหางมีลักษณะ ตัดตรงหรือโค้งเล็กน้อย ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลแดง มีแถบสีเข้มพาดตลอดความยาวของ ลำตัวทางด้านข้าง ด้านท้องมีสีจาง ครีบใส (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 4 - 6 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาสายทอง ได้แก่ สฉิง

การแพร่กระจาย พบปลาสายทอง *P. anguillaris* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

แขยงหิน *Pseudomystus siamensis*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Bagridae

Pseudomystus siamensis

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาว ด้านท้ายมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วน หัวมีขนาดเล็ก ตาและปากมีขนาดเล็ก มีหนวดสั้น 4 คู่ ครีบหลังและครีบอกมีก้านครีบแข็งคล้าย หนาม ครีบกันมีขอบโค้งมน ฐานครีบไขมันยาวและสูงขึ้นทางด้านท้าย ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ สลับกับสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อนเป็นแถบพาดตามลำตัว ครีบใส และมีแต้มสีดำ ครีบไขมันมีสีน้ำตาลหรือสีดำ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 6 - 12 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแขยงหิน ได้แก่ ยอ ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาแขยงหิน *P. siamensis* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

แขยงธง *Heterobagrus bocourti*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Bagridae

Heterobagrus bocourti

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวและมีลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยม ด้านท้ายมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวเรียวเล็ก ตามีขนาดค่อนข้างใหญ่ ริมฝีปากหนา มีหนวด 4 คู่ หนวดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือหนวดที่ขากรรไกรบนซึ่งยาวจนถึงครีบทหาง ครีบทหลังยาวมาก ครีบทไขมีขนาดใหญ่ ครีบทหางยาวและมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเทาเงินเหลือบสีเขียว ด้านท้องมีสีจาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแขยงธง ได้แก่ ยอ มอญ เบ็ด ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาแขยงธง *H. bocourti* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

แขยงใบข้าว *Mystus singaringan*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Bagridae

Mystus singaringan

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ตาอยู่ค่อนข้างต่ำมาทางด้านบนของส่วนหัว ปากอยู่ค่อนข้างต่ำมาทางด้านล่างของส่วนหัว มีหนวด 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวจนถึงฐานของครีบท้อง ฐานครีบท้องยาวและมีจุดเริ่มต้นต่อจากฐานของครีบท้อง ครีบท้องมีก้านครีบท้องแข็งแรงหนาม ครีบท้องมีลักษณะเว้าลึกปลายแหลม แพนหางด้านบนยาวมากกว่าด้านล่าง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 7 – 15 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแขยงใบข้าว ได้แก่ ยอ มอญ เบ็ด ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาแขยงใบข้าว *M. singaringan* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

แขยงข้างลาย *Mystus mysticetus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Bagridae

Mystus mysticetus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและด้านท้ายมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวแบนลง มีหนวด 4 คู่ ครีบท้องและครีบท้องมีก้านครีบท้องแข็งแรงหนาม ครีบท้องมีขนาดเล็ก ครีบท้องมีลักษณะเว้าลึกและมีปลายแหลม ลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลหรือสีดำ ด้านข้างลำตัวมีสีดำและมีแถบสีขาวพาดยาวจากบริเวณครีบท้องถึงโคนครีบท้อง 2 แถบ ด้านท้องมีสีขาว บริเวณเหนือครีบท้องมีจุดสีดำมีขอบสีขาวขนาดใหญ่อยู่ 1 จุด (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 6 - 12 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแขยงข้างลาย ได้แก่ ยอ มอญ เบ็ด ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาแขยงข้างลาย *M. mysticetus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

แขยงข้างลาย *Mystus atrifasciatus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Bagridae

Mystus atrifasciatus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและด้านท้ายมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวแบนราบ ตามีขนาดใหญ่ มีหนวดยาว ครีบไขมันยาวกว่าความยาวของส่วนหัว ก้านครีบหลังและครีบอกแข็งและแหลมคม ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวสีเทาหรือสีดำ มีแถบสีขาวพาดยาวถึงโคนหาง 1 - 2 แถบ ด้านท้องมีสีจาง ครีบใสหรือมีสีเทาจาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 8 - 12 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแขยงข้างลาย ได้แก่ ยอ มอญ เบ็ด ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาแขยงข้างลาย *M. atrifasciatus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

กตเหลือง *Hemibagrus filamentus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Bagridae

Hemibagrus filamentus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอก ด้านท้ายมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวแบนราบ ตามีขนาดเล็ก อยู่ค่อนข้างไปทางด้านบนของส่วนหัว ครีบอกมีก้านแข็งคล้ายหนาม ครีบหลังและครีบท้องมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ครีบท้องมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเทาหรือสีเขียวอมเหลือง ด้านบนมีสีเข้ม ด้านท้องมีสีขาวเงิน ครีบบมีสีเข้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 18 - 30 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลากดเหลือง ได้แก่ ยอ มอง เบ็ด ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลากดเหลือง *H. filamentus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

กดแก้ว *Hemibagrus wickioides*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Bagridae

Hemibagrus wickioides

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอก ด้านท้ายมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวแบนราบ ตามีขนาดเล็ก ด้านบนของส่วนหัวมีร่องตรงกลางตามแนวยาว มีหนวด 4 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวเลยฐานของครีบท้อง ครีบอกมีก้านแข็งคล้ายหนาม ครีบไขมันยาว ครีบท้องมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเทา เขียวหรือสีชมพู ด้านบนมีสีเข้มหรือสีเทาดำ ด้านท้องมีสีจาง ครีบบมีสีเข้มหรือสีแดงเรื่อ ครีบท้องมีสีแดงหรือสีส้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 40 - 80 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลากดแก้ว ได้แก่ ยอ เบ็ด ลอบ

การแพร่กระจาย พบปลากดแก้ว *H. wickioides* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

คางเป็อน *Belodontichthys dinema*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Siluridae

Belodontichthys dinema

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวและปากมีขนาดใหญ่และมีลักษณะงอนขึ้นทางด้านบน มีหนวด 1 คู่ยาวถึงครีบอกตามีขนาดใหญ่และอยู่เหนือมุมปาก ปากกว้าง ฟันมีลักษณะแหลมยาว ขากรรไกรล่างยื่นยาวเลยขากรรไกรบน ครีบอกมีขนาดใหญ่ ครีบท้องและครีบท้องหลังมีขนาดเล็ก ส่วนฐานครีบก้นยาวมาก ลำตัวทางด้านล่างมีสีเงิน ด้านบนมีสีเหลืองอมเขียว (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 35 - 70 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับคางเป็อน ได้แก่ เบ็ด ยอ มอ

การแพร่กระจาย พบปลาคางเป็อน *B. dinema* ในบริเวณ บ้านพงสวาย อำเภอบ้านด่าน จังหวัดสุรินทร์

ปิโก่ *Kryptopterus cheveyi*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Siluridae

Kryptopterus cheveyi

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวและปากมีขนาดเล็กและมีลักษณะแบนราบ มีหนวด 2 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวกว่าหนวดที่ขากรรไกรล่าง ไม่มีครีบท้อง ครีบท้องมีขนาดเล็ก ส่วนฐานครีบก้นยาวมาก ครีบอกมีขนาดใหญ่ ครีบทงมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเทาเงินหรือสีอมแดงเรื่อ ๆ โดยเฉพาะที่ส่วนหัว (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาปักไก่อ ได้แก่ ยอ มอ

การแพร่กระจาย พบปลาปักไก่อ *K. cheveyi* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ขาไก่อ *Kryptopterus geminus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Siluridae

Kryptopterus geminus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีขนาดเล็กและสั้น ตามีขนาดใหญ่ มีหนวด 2 คู่ ครีบท้องมีขนาดเล็กมาก ฐานครีบก้นยาวมาก ครีบอกมีขนาดใหญ่ ครีบทงมีลักษณะเว้าตื้นและมีปลายมน ลำตัวมีสีเขียวอมเหลือง ครีบท้องมีสีจางและมีขอบสีเข้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 8 - 15 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาปักไก่อ ได้แก่ ยอ มอ

การแพร่กระจาย พบปลาปักไก่อ *K. geminus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

น้ำเงิน *Micronema apogon*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Siluridae

Micronema apogon

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวกว้างและมีลักษณะแบนราบ ปากกว้าง ปากล่างยื่นยาวมากกว่าปากบนและงอนขึ้น มีหนวด 2 คู่ หนวดที่ขากรรไกรล่างมีขนาดเล็กมาก ไม่มีครีบหลัง ฐานครีบกันยาวมาก ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเงินวาวหรือสีเงินอมชมพู ด้านบนของลำตัวมีสีเข้มกว่าทางด้านล่าง ครีบกันและครีบหางมีสีจางและมีขอบสีเข้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 30 - 60 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาน้ำเงิน ได้แก่ ยอ มอญ เบ็ด

การแพร่กระจาย พบปลาน้ำเงิน *M. apogon* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

แดง *Micronema bleekeri*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Siluridae

Micronema bleekeri

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีลักษณะแบนราบ ตามีขนาดใหญ่ ปากล่างยื่นยาว มีหนวด 2 คู่ ไม่มีครีบหลัง ฐานครีบก้นยาวมาก ครีบหางมีลักษณะเว้าตื้นและมีปลายมน ลำตัวมีสีเงินขาวหรือสีเงินวาวอมแดง ด้านบนของลำตัวมีสีเขียวอมเทา มีแถบสีเข้มตลอดความยาวของฐานครีบก้น (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 25 - 40 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแดง ได้แก่ ยอ มอง เบ็ด

การแพร่กระจาย พบปลาแดง *M. bleekeri* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

สยมพร *Ompok krattensis*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Siluridae

Ompok krattensis

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ด้านข้างลำตัวเหนือครีบอกมีจุดสีดำขนาดใหญ่ ส่วนหัวสั้น ตามีขนาดใหญ่ มีหนวด 2 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวถึงจุดเริ่มต้นของครีบก้น หนวดที่ขากรรไกรล่างมีขนาดเล็ก ส่วนฐานครีบก้นยาว ครีบหางมีลักษณะเว้าลึกและปลายมน ลำตัวมีสีเทาเงินหรือสีเทาดำ ด้านบนของลำตัวมีสีเข้มกว่าทางด้านล่าง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 12 - 20 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาสยมพร ได้แก่ ยอ มอง เบ็ด

การแพร่กระจาย พบปลาสยมพร *O. krattensis* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

เค้าขาว *Wallago attu*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Siluridae

Wallago attu

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ ปากกว้างมาก มุมปากอยู่เลยหลังลูกตา ตามีขนาดเล็ก มีหนวด 2 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนมีขนาดใหญ่กว่า หนวดที่ขากรรไกรล่าง ครีบหลังมีขนาดเล็กและปลายแหลม ครีบอกมีขนาดใหญ่ ส่วนฐานของครีบก้นยาวมาก ครีบท้องมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเทาเงิน ด้านบนของลำตัวมีสีเข้ม ด้านล่างมีสีขาว (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 60 - 200 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาเค้าขาว ได้แก่ ยอ มอง เบ็ด

การแพร่กระจาย พบปลาเค้าขาว *W. attu* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

สังกะวาดขาว *Lalates longibarbis*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Pangasiidae

Lalates longibarbis

รูปร่างลักษณะ ลำตัวมีลักษณะเรียวยาว ส่วนหัวมีขนาดเล็กมน ตามีขนาดใหญ่ มีหนวด 3 คู่ หนวดที่ริมฝีปากยาวถึงครีบก้น สันท้องคม ครีบก้นยาว ครีบก้นมีขนาดเล็ก ส่วนหัวและลำตัวมีสีฟ้าปนเทาหรือสีชาวนวล ครีบบนมีสีเทาจาง ครีบก้นมีสีเหลืองอ่อน (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 10 - 18 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาสังกะวาดขาว ได้แก่ ยอ มอญ แห

การแพร่กระจาย พบปลาสังกะวาดขาว *L. longibarbis* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

บึก *Pangasianodon gigas*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Pangasiidae

Pangasianodon gigas

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาว ส่วนหัวแบนราบ ส่วนท้ายของลำตัวแบนทางด้านข้าง หัวมีขนาดใหญ่ ตำแหน่งของตาอยู่ค่อนข้างต่ำกลางต่ำกว่าระดับแนวมุมปาก เป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ลำตัวมีสีเทาอ่อนทางด้านบน ด้านล่างเป็นสีเงิน ครีบบนมีสีเทา (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 150 - 250 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาบึก ได้แก่ ยอ มอญ เบ็ด

การแพร่กระจาย พบปลาบึก *P. gigas* ในบริเวณบ้านวังปลัด อำเภอดุสิต หมู่บ้านชาวประมง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านอ้อตลิ่งชันอำเภอสระบุรี และบ้านพงสวาย อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เผาะ *Pangasius conchophilus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Pangasiidae

Pangasius conchophilus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาว ส่วนหัวและตามีขนาดค่อนข้างเล็ก ปากอยู่ทางด้านล่าง มีหนวด 1 คู่ หนวดยาวถึงช่องเหงือก คอดหางแคบ ก้านครีบแข็งของครีบหลังมีขนาดใหญ่ ครีบกันยาว มีก้านครีบ 26 - 29 อัน ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ส่วนหัวและลำตัวมีสีเทา เหลือง หรือสีเขียว ด้านข้างลำตัวและส่วนท้องมีสีจาง ครีบมีสีเทาจางหรือสีเหลืองอ่อน (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 35 - 80 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาเผาะ ได้แก่ ยอ มอง แห

การแพร่กระจาย พบปลาเผาะ *P. conchophilus* ในบริเวณบ้านวังปลัด อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บ้านวังปลัด อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บ้านวังปลัด อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บ้านวังปลัด อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สวาย *Pangasius hypophthalmus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Pangasiidae

Pangasius hypophthalmus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวป้อม ส่วนหัวมีขนาดเล็ก ตาอยู่ในระดับแนวมุมปากหรือสูงกว่าเล็กน้อย ปากมีขนาดเล็ก ฐานครีบสั้นยาว ครีบอกมีก้านครีบแข็งคล้ายหนาม ครีบไขมันมีขนาดเล็ก ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเงินหรือสีเข้ม ด้านข้างลำตัวมีสีจางลง ส่วนท้องมีสีขาวเงิน (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 40 - 80 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาทราย ได้แก่ ยอ มอง เบ็ด

การแพร่กระจาย พบปลาทราย *P. hypophthalmus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

เทโพ *Pangasius larnaudi*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Pangasiidae

Pangasius larnaudi

รูปร่างลักษณะ ลำตัวป้อมสั้นและมีลักษณะแบนทางด้านข้างเล็กน้อย ส่วนหัวกว้าง ปากมีลักษณะโค้งมนและอยู่ค่อนข้างต่ำทางด้านล่างของส่วนหัวเล็กน้อย มีหนวด 2 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวกว่าหนวดที่ขากรรไกรล่าง ครีบอกมีก้านครีบแข็งคล้ายหนาม ฐานครีบสั้นยาว ส่วนปลายของครีบหลัง ครีบอก ครีบท้องและครีบกันย่นเป็นเส้นเรียวยาว ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเงิน เทาดำหรือสีเทาปนน้ำตาล ด้านล่างมีสีขาวปนเทา เนื้อครีบอกมีจุดสีดำขนาดใหญ่ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 30 - 80 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาเทโพ ได้แก่ ยอ มอง เบ็ด

การแพร่กระจาย พบปลาเทโพ *P. larnaudi* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

สังกะวาด *Pangasius macronema*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Pangasiidae

Pangasius macronema

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีขนาดเล็ก ตามีขนาดใหญ่ มีหนวด 2 คู่ หนวดที่ขากรรไกรบนยาวกว่าหนวดที่ขากรรไกรล่างและยาวถึงปลายครีบอก ครีบอกมีก้านครีบแข็งคล้ายหนาม ปลายครีบหลังและครีบอกมีลักษณะเป็นเส้นเรียวยาวฐานครีบก้นยาว ครีบไขมันมีขนาดเล็กมาก ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเทาปนสีเหลืองทอง หรือสีเขียว ด้านข้างลำตัวมีแถบสีเข้มยาวไปถึงโคนครีบหาง ครีบหางสีเหลือง ขอบด้านท้ายมีสีดำ ครีบอื่น ๆ มีสีเหลืองจาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 15 - 25 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาสังกะวาด ได้แก่ ยอ มอญ แห

การแพร่กระจาย พบปลาสังกะวาด *P. macronema* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

สังกะวาดทองคม *Pangasius pleurotaenia*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Pangasiidae

Pangasius pleurotaenia

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวป้อมสั้น ตามีขนาดใหญ่ ส่วนท้องมีลักษณะเป็นสันคมตั้งแต่บริเวณครีบอก ครีบท้องมีขนาดเล็ก ครีบก้นยาว ครีบทวารมีขนาดเล็ก ส่วนครีบท้องมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวด้านบนมีสีเขียวหรือเหลืองด้านข้าง ลำตัวสีจางและมีแถบยาวสีเข้ม ด้านล่างเป็นสีเงิน ครีบท้องมีสีเหลืองอ่อนขอบด้านท้ายมีสีเข้ม ส่วนครีบอื่น ๆ มีสีเทาจางและโปร่งแสง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 15 - 30 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาสังกะวาดท้องคม ได้แก่ ยอ มอง แห

การแพร่กระจาย พบปลาสังกะวาดท้องคม *P. pleurotaenia* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

สวายหนู *Helicophagus leptorhynchus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Pangasiidae

Helicophagus leptorhynchus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีขนาดเล็กและมีลักษณะแบนลงด้านล่าง ตามีขนาดเล็ก ปากมีลักษณะเรียวยาวเล็ก ครีบอกมีก้านครีบแข็งคล้ายหนามฐานครีบก้นยาวมาก ครีบทวารมีขนาดเล็ก ครีบท้องมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีเทาเงิน ส่วนหัวมีสีเทาอมชมพู ด้านท้องมีสีจาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาสวายหนู ได้แก่ ยอ มอง เบ็ด แห

การแพร่กระจาย พบปลาสวายหนู *H. leptorhynchus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

แค้ควาย *Bagarius yarrelli*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Sisoridae

Bagarius yarrelli

รูปร่างลักษณะ ลำตัวและส่วนหัวมีลักษณะแบนราบ ปากบนยื่นยาวมากกว่าปากล่าง ตามีขนาดเล็ก และอยู่ด้านบนของส่วนหัว หนวดมีลักษณะเป็นเส้นแข็ง ครีบหลังและครีบอกมีก้านแข็งคล้ายหนาม ครีบไขมันอยู่ไกลไปทางด้านท้ายของลำตัว ด้านหน้าและด้านท้ายของครีบไขมันมีส่วนที่นูนเป็นสันขนาดเล็ก ครีบหางมีลักษณะเว้าลึกและส่วนปลายเรียวเป็นเส้นยาว ลำตัวมีสีน้ำตาลปนเหลือง ด้านบนมีแถบสีเข้มเป็นหย่อม ๆ ด้านท้องมีสีจาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 40 - 120 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแค้ควาย ได้แก่ ยอ เบ็ด แห

การแพร่กระจาย พบปลาแค้ควาย *B. yarrelli* ในบริเวณบ้านวังปลัด อำเภอกู่เมือง หมู่บ้านชาวประมง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านอ้อตลิ่งชัน อำเภอสระบุรี และบ้านพงสวาย อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

แค้ตืดหิน *Glyptothorax lampris*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Sisoridae

Glyptothorax lampris

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอก ด้านท้ายมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีลักษณะแบนราบ มีหนวด 4 คู่ ผิวลำตัวมีตุ่มขนาดเล็ก ครีบอกมีขนาดใหญ่และมีก้านครีบแข็ง คล้ายหนาม ครีบไขมันมีขนาดใหญ่ ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวมีสีน้ำตาลหรือสีเทาปนเหลืองและมีแถบสีเข้มเป็นปื้น ครีบหลังและครีบหางมีแถบสีเข้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 8 - 12 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแค้ติดหิน ได้แก่ ยอ สวิง

การแพร่กระจาย พบปลาแค้ติดหิน *G. lampris* ในบริเวณบ้านวังปลัด อำเภอคูเมือง หมู่บ้านชาวประมง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านอ้อตลิ่งชัน อำเภอสระบุรี และบ้านพงสวาย อำเภอกำแพง จังหวัดสุรินทร์

ขยุย *Akysis varius*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Akysidae

Akysis varius

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาว ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ ตามีขนาดเล็กอยู่ทางด้านบนของส่วนหัว ครีบอกมีขนาดใหญ่และมีก้านครีบแข็งยาว ส่วนหัวและลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน และมีแถบสีเข้มเป็นช่วง ๆ ตั้งแต่ส่วนหัวไปจนตลอดลำตัว ครีบบีสีน้ำตาลหรือสีเทาอ่อนและมีจุดสีเข้มกระจายเป็นแห่ง ๆ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร เป็นปลานขนาดเล็ก

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาขยุย ได้แก่ สวิง อวนตาถี่

การแพร่กระจาย พบปลาขยุย *A. varius* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ดูกด้าน *Clarias batrachus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Clariidae

Clarias batrachus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกยาว ด้านท้ายมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีลักษณะแบนราบ ท้ายทอยมีลักษณะแคบและยื่นแหลม ตามีขนาดเล็ก จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ใกล้กับท้ายทอย ฐานของครีบหลังและครีบกันยาวมาก ครีบอกมีก้านครีบแข็งคล้ายหนาม 1 อัน ครีบท้องเล็ก ปลายครีบหางมีลักษณะโค้งมน ลำตัวมีสีเงินเขียวจนถึงเทาดำ ส่วนท้องมีสีจาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 20 - 35 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาดูกด้าน ได้แก่ มอญ เบ็ด ลอบ

การแพร่กระจาย พบปลาดูกด้าน *C. batrachus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ดูกอุย *Clarias macrocephalus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Siluriformes

Family Clariidae

Clarias macrocephalus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกยาว ด้านท้ายมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีลักษณะแบนราบ ท้ายทอยมีลักษณะกลมมนและสั้น ไม่ยื่นแหลม ฐานของครีบท้องและครีบก้นยาวมาก ครีบท้องมีก้านครีบแข็งคล้ายหนาม 1 อัน ปลายครีบท้องมีลักษณะโค้งมน ลำตัวมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลปนดำ ส่วนท้องมีสีเหลือง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 20 - 35 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาตกอยู่ ได้แก่ มอญ เบ็ด ลอบ

การแพร่กระจาย พบปลาตกอยู่ *C. macrocephalus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

กระทุงเหว *Xenentodon cancila*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Beloniformes

Family Belonidae

Xenentodon cancila

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาว ด้านท้ายมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนปากยื่นยาวไปทางด้านหน้า ตามีขนาดใหญ่ เกล็ดมีขนาดเล็ก ไม่มีเกล็ดบริเวณแผ่นกระดูกปิดเหงือก ครีบท้องมีขนาดใหญ่ ครีบท้องมีขนาดเล็ก ครีบท้องและครีบก้นอยู่ค่อนข้างไปทางด้านท้ายของลำตัว โดยมีจุดเริ่มต้นของครีบท้องตรงกันและขอบด้านท้ายของครีบท้องมีลักษณะเว้าเข้าไป ลำตัวด้านบนมีสีเหลืองอมเขียว ด้านข้างและด้านล่างมีสีขาว ครีบท้องหรือมีสีเทาขาว (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 15 - 30 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลากระทุงเหว ได้แก่ ยอ แห

การแพร่กระจาย พบปลากระทุงเหว *X. cancila* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

เข็ม *Dermogynys siamensis*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Beloniformes

Family Hemirhamphidae

Dermogynys siamensis

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาว ด้านท้ายมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนปากล่างยื่นยาวไปทางด้านหน้ามาก ปากบนสั้นและมีลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยม ตามีขนาดใหญ่ เกล็ดมีขนาดเล็ก ครีบหลังและครีบกันอยู่ค่อนข้างไปทางด้านท้ายของลำตัว โดยมีจุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หลังจุดเริ่มต้นของครีบกัน ครีบหางมีลักษณะโค้งมน ลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลอ่อน ด้านล่างมีจาง ส่วนครีบบมีสีจาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 4 - 5 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาเข็ม ได้แก่ สฉิง

การแพร่กระจาย พบปลาเข็ม *D. siamensis* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ไหลนา *Monopterus albus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Synbranchiformes

Family Synbranchidae

Monopterus albus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาว ด้านหน้าและกลางลำตัวมีลักษณะคล้ายรูปทรงกระบอก ด้านท้ายเรียวเล็กและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีขนาดใกล้เคียงกับลำตัว ปากเรียวเล็ก และยื่นไปทางด้านหน้า ตามีขนาดเล็กมาก ส่วนหางเรียวยาวและแบนทางด้านข้าง ผิวลำตัวมีเมือกลื่นปกคลุม ไม่มีเกล็ดและครีบ ลำตัวมีสีน้ำตาลแดง ด้านบนมีสีเข้ม ส่วนด้านล่างมีสีจาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 40 - 60 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาไหลนา ได้แก่ เบ็ด ลัน

การแพร่กระจาย พบปลาไหลนา *M. albus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

หลด *Macrograthus siamensis*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Synbranchiformes

Family Mastacembelidae

Macrognathus siamensis

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวเล็กแหลม ตามีขนาดเล็ก ปากเล็กและยื่นแหลม ครีบหลัง ครีบก้นและครีบหางแยกจากกัน ครีบหางมีลักษณะโค้งมน ลำตัวมีสีเทาอ่อน ด้านบนมีสีเทาเข้ม ส่วนท้องมีสีจาง มีจุดสีดำขอบสีขาวมีลักษณะคล้ายกับตาที่จัดเรียงตามแนวยาวตลอดความยาวของฐานครีบหลัง และมี 1 จุดที่โคนครีบหาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 12 - 20 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาหลด ได้แก่ เบ็ด แห

การแพร่กระจาย พบปลาหลด *M. siamensis* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

หลอดหลังจุด *Macrograthus semiocellatus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Synbranchiformes

Family Mastacembelidae

Macrognathus semiocellatus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวเล็กแหลม ตามีขนาดเล็ก ปากเล็กและยื่นแหลม ครีบหลัง ครีบกันและครีบหางเชื่อมติดกัน จุดเริ่มต้นของก้านครีบอก่อนของครีบกันอยู่หน้าจุดเริ่มต้นของก้านครีบอก่อนของครีบหลังชัดเจน ครีบหางมีลักษณะค่อนข้างแหลมและมีปลายชี้ตรง ลำตัวมีสีน้ำตาล น้ำตาลอมเหลือง หรือสีน้ำตาลอมเขียว มีลายพาดขวางลำตัวประมาณ 16 - 22 แถบ มีจุดกลมสีดำที่จัดเรียงเป็นแนวตลอดความยาวของฐานครีบหลัง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 10 - 16 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาหลอดหลังจุด ได้แก่ เบ็ด แห

การแพร่กระจาย พบปลาหลอดหลังจุด *M. semiocellatus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

กระทิง *Mastacembelus armatus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Synbranchiformes

Family Mastacembelidae

Mastacembelus armatus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวเรียวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวเรียวยาวเล็ก ตามีขนาดเล็ก ปากเล็กและยื่นยาวแหลม ครีบหลัง ครีบกันและครีบหางเชื่อมต่อกัน จุดเริ่มต้นของครีบอ่อนของครีบหลังอยู่ตรงกับจุดเริ่มต้นของก้านครีบอ่อนของครีบกัน ปลายครีบหางมีลักษณะโค้งมน ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเหลือง มีลายสีเข้มเป็นวงหรือเป็นปื้นตลอดทั้งตัว ครีบมีสีเข้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 25 - 50 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลากระติง ได้แก่ เบ็ด

การแพร่กระจาย พบปลากระติง *M. armatus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

แป้นแก้ว *Parambassis siamensis*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Perciformes

Family Ambassidae

Parambassis siamensis

รูปร่างลักษณะ ลำตัวมีรูปร่างกลมรีและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวและตามีขนาดใหญ่ ลำตัวใสจนสามารถมองเห็นกระดูก ฐานครีบหลังและครีบกันยาว ก้านครีบแข็งของครีบกันอันที่ 3 ยาวที่สุด ครีบอกมีขนาดใหญ่ ใสและมีส่วนปลายโค้งมน ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก ลำตัวใส ส่วนท้องมีสีขาวหรือสีเงินวาว ครีบใสหรือมีสีเทาเข้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 4 - 6 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาแป้นแก้ว ได้แก่ ยอ แห

การแพร่กระจาย พบปลาแป้นแก้ว *P. siamensis* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

หมอข้างเหี้ยยบ *Pristolepis fasciatus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Perciformes

Family Nandidae

Pristolepis fasciatus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปร่างกลมรีและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ตามีขนาดใหญ่และอยู่ค่อนข้างด้านบนของส่วนหัว ส่วนปากมีขนาดเล็กและยืดหดได้ ครีบอกมีลักษณะยาวรีส่วนปลายโค้งมน ฐานของครีบหลังยาวและมีก้านครีบแข็งเป็นหนามแหลมจำนวนมาก ครีบหางยาวส่วนปลายมีลักษณะโค้งมน ลำตัวมีสีน้ำตาล เหลือง เขียวหรือสีเทาเข้ม ด้านบนมีสีเข้ม ด้านท้องมีสีจางหรือสีเหลืองอ่อน มีแถบสีเข้มพาดตามขวางลำตัว 8 - 10 แถบ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 8 - 16 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาหมอข้างเหี้ยยบ ได้แก่ เบ็ด แห

การแพร่กระจาย พบปลาหมอข้างเหี้ยยบ *P. fasciatus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ดุมซี *Nandus oxyrhynchus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Perciformes

Family Nandidae

Nandus oxyrhynchus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวมีรูปร่างกลมรีและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวเรียวยื่นยาวออกไปทางด้านหน้า ตามีขนาดใหญ่ ปากกว้างและยืดหดได้ ฐานของครีบหลังยาวและมีก้านครีบแข็งจำนวนมาก ส่วนปลายของครีบหางมีลักษณะโค้งมน ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเหลือง มีลายสีเข้มเป็นปื้นกระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ส่วนหัวจนถึงโคนครีบหาง ครีบอกและครีบหางใส ครีบอื่น ๆ มีสีเข้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 4 - 8 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาคุมซี ได้แก่ สวิง

การแพร่กระจาย พบปลาคุมซี *N. oxyrhynchus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

นิล *Oreochromis niloticus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Perciformes

Family Cichlidae

Oreochromis niloticus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ ครีบอกมีขนาดใหญ่ ฐานครีบหลังยาวมาก มีก้านครีบแข็งจำนวน 17 – 18 อัน ปลายครีบหางมีลักษณะตัดตรงหรือเว้าเล็กน้อย ลำตัวมีสีเขียวหรือน้ำตาลอมเหลือง ด้านบนของลำตัวมีสีเข้มกว่าทางด้านล่าง ครีบบีมีสีเหลืองหรือสีเทาจาง ครีบหลังหรือครีบหางมีจุดหรือลายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 12 - 25 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลานิล ได้แก่ ยอ มอง เบ็ด ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลานิล *O. niloticus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ปูทราย *Oxyeleotris marmoratus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Perciformes

Family Eleotrididae

Oxyeleotris marmoratus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอก ด้านท้ายมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวมีขนาดใหญ่และปลายทางด้านหน้ามีลักษณะแบนลง ส่วนปากนูนและยื่นออกไปทางด้านหน้า ขากรรไกรล่างยื่นยาวมากกว่าขากรรไกรบน ส่วนต่ายื่นสั้นเล็กน้อย ครีบหลังแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนหน้ามีลักษณะคล้ายครึ่งวงกลม ตอนหลังมีฐานยาวกว่าตอนหน้ามาก ครีบอกมีขนาดใหญ่ และส่วนปลายมีลักษณะโค้งมน ฐานครีบก้นค่อนข้างยาว ครีบทงมีลักษณะค่อนข้างกลมและมีขนาดใหญ่ ลำตัวมีสีน้ำตาล หรือสีน้ำตาลอมเหลือง มีลายเป็นจุดหรือเป็นปื้นอยู่ทั่วไป ครีบบมีสีน้ำตาล น้ำตาลแดงหรือน้ำตาลเหลือง และมีแถบสีหรือจุดอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 15 - 30 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาปูทราย ได้แก่ มอญ ลอบ

การแพร่กระจาย พบปลาปูทราย *O. marmoratus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

หมอ *Anabas testudineus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Perciformes

Family Anabantidae

Anabas testudineus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวป้อมและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนปากอยู่ปลายด้านหน้าสุดของส่วนหัว ฐานของครีบหลังและครีบก้นยาว ครีบหลังมีก้านครีบแข็งแหลม 17 - 18 อัน ครีบก้นมีก้านครีบแข็งแหลม 8 - 10 อัน ขอบฝาปิดเหงือกมีลักษณะเป็นหยักแข็งและคม ครีบหางมีลักษณะโค้งมน ลำตัวมีสีน้ำตาล เหลือง เขียวหรือสีเทาดำ ด้านท้องมีสีเหลือง ด้านท้ายของแผ่นปิดเหงือกมีจุดสีดำ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 8 - 15 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาหมอ ได้แก่ มอญ เบ็ด แห

การแพร่กระจาย พบปลาหมอ *A. testudineus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

กริมสี *Trichopsis pumila*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Perciformes

Family Belontiidae

Trichopsis pumila

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนปากยื่นออกไปทางด้านหน้าและเขยิบขึ้นไปทางด้านบนเล็กน้อย ตามีขนาดใหญ่ ครีบหลังอยู่ค่อนข้างด้านหลังของลำตัว ฐานของครีบก้นยาวมาก ส่วนปลายของครีบท้องยื่นออกไปมีลักษณะเรียวยาว ครีบหางมีปลายแหลมยาวชี้ตรง ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน มีจุดสีเขียวหรือสีฟ้าเป็นประกายและมีแถบสีเข้มพาดตามแนวยาว ครีบบมีจุดสีฟ้า แดงหรือสีน้ำตาลกระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลากริมสี ได้แก่ ลอบ สวิง

การแพร่กระจาย พบปลากริมสี *T. pumila* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

กริมควาย *Trichopsis vittatus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Perciformes

Family Belontiidae

Trichopsis vittatus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนปากอยู่ปลายสุดทางด้านหน้าของส่วนหัว ตามีขนาดใหญ่ จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ก่อนไปทางด้านท้ายของลำตัว ครีบท้องมีขนาดเล็กและส่วนปลายเรียวยาว ฐานของครีบกันยาว ครีบหางมีขนาดใหญ่และส่วนปลายแหลมยาวชี้ตรง ลำตัวมีสีน้ำตาลอมแดง เหลือบสีฟ้าหรือสีเขียว ด้านข้างลำตัวมีแถบสีเข้มพาดตามแนวยาวจากปากจนถึงฐานครีบหาง จำนวน 3 แถบ มีจุดสีดำขนาดใหญ่อยู่บริเวณเหนือครีบอก ครีบหลัง ครีบกันและครีบหางมีจุดสีน้ำตาลแดงกระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 4 - 6 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลากริมควาย ได้แก่ ลอบ สวิง

การแพร่กระจาย พบปลากริมควาย *T. vittatus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

กระดี่หม้อ *Trichogaster trichopterus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Perciformes

Family Belontiidae

Trichogaster trichopterus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปร่างกลมรีและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนปากมีขนาดเล็ก ครีบอกมีขนาดใหญ่ ครีบท้องมีลักษณะเป็นเส้นยาว ฐานครีบก้นยาวมาก ครีบหลังยาวถึงฐานของครีบกาง ครีบกางมีลักษณะเว้าตื้น ลำตัวมีสีเทาจนถึงเทาดำ เหลือบสีฟ้าหรือสีเหลือง มีแถบสีเข้มพาดในแนวเฉียงตลอดความยาวของลำตัวหลายแถบ มีจุดกลมสีดำที่มีขนาดเท่ากับลูกตา บริเวณกลางลำตัว 1 จุด และบริเวณหางอีก 1 จุด ครีบหลัง ครีบก้นและครีบกางมีจุดสีส้ม เหลือง หรือสีเข้มกระจายอยู่ทั่วไป ครีบอกใสไม่มีสี (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 6 - 10 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลากระดี่หม้อ ได้แก่ มอง แห

การแพร่กระจาย พบปลากระดี่หม้อ *T. trichopterus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

สลิิด *Trichogaster pectoralis*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Perciformes

Family Belontiidae

T. pectoralis

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปร่างกลมรีและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนปากมีขนาดเล็ก ครีบอกมีขนาดใหญ่ ครีบท้องเป็นเส้นยาว ครีบหลังอยู่ค่อนข้างด้านหลังของลำตัว ปลาครีบหลังของปลาเพศผู้มีลักษณะยื่นยาว ครีบกางมีลักษณะเว้าตื้นและปลายมน ลำตัวมีสีน้ำตาล เทาหรือสีเขียว มีแถบสีเข้มพาดตามแนวยาวกลางลำตัว และมีแถบสีจางพาดขวางลำตัวหลายแถบ ครีบก้นมีสีน้ำตาลหรือสีเทาเข้ม (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาสลิิด ได้แก่ ยอ มอง เบ็ด ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาสลิิด *T. pectoralis* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ก๊าด *Betta smaragdina*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Perciformes

Family Belontiidae

Betta smaragdina

รูปร่างลักษณะ ลำตัวยาวเรียวและมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวสั้น ปากมีขนาดเล็กและเขี้ยวเล็กน้อย ครีบท้องเป็นเส้นเรียวยาว ฐานครีบสั้นยาว ส่วนปลายด้านท้ายของครีบสั้นเรียวยาว ครีบหางมีขนาดใหญ่ ลำตัวมีสีน้ำตาล เหลืองส้มแดง น้ำเงินหรือสีเขียว และมีลายหรือจุดสีดำ ครีบอกใส (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 4 - 6 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลากัด ได้แก่ สวิง

การแพร่กระจาย พบปลากัด *B. smaragdina* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ก้าง *Channa gachua*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Perciformes

Family Channidae

Channa gachua

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาว ส่วนท้ายของลำตัวมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวป้อมสั้น ครีบหางมีลักษณะโค้งมน ฐานครีบหลังและครีบกันยาวมาก ครีบอกมีขนาดใหญ่ ส่วนหัวและลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงเทาเข้ม ส่วนท้องมีสีจาง ครีบหลัง ครีบกันและครีบหางมีสีเทา ส่วนขอบมีสีส้มหรือสีแดง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาก้าง ได้แก่ เบ็ด ลอบ

การแพร่กระจาย พบปลาก้าง *C. gachua* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

กระสง *Channa lucius*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Perciformes

Family Channidae

Channa lucius

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาว ส่วนหัวเรียวเล็ก ตามีขนาดเล็ก ครีบหลังและครีบกันยาว ครีบอกมีขนาดใหญ่ ครีบหางมีลักษณะโค้งมน ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเหลือง หรือสีเขียวเข้ม มีรอยด่างเป็นปื้นทั้งส่วนหัวและลำตัว ส่วนท้องมีสีจาง ครีบบนมีสีน้ำตาลอมเหลือง มีจุดและลายสีเข้มสลับ (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 20 - 40 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลากระสง ได้แก่ เบ็ด ลอบ

การแพร่กระจาย พบปลากระสง *C. lucius* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ชะโด *Channa micropeltes*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Perciformes

Family Channidae

Channa micropeltes

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาว ด้านหน้าของส่วนหัวมีลักษณะแบนลง ส่วนด้านท้ายของลำตัวมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ฐานครีบหลังและครีบกันยาวมาก ครีบอกมีขนาดใหญ่ ปลายครีบหางมีลักษณะโค้งมน ลำตัวมีสีเขียวหรือเหลืองอมน้ำตาล ด้านข้างของลำตัวมีแถบสีเข้มพาดตามแนวยาว มีสีน้ำตาลเงินอมเขียวหรือสีเข้มพาดขวางอยู่ทางส่วนบนของลำตัว ส่วนท้องมีสีจาง (ภาพที่ 3)

ปลาชะโดเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 40 - 80 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาชะโด ได้แก่ ยอ เบ็ด แห

การแพร่กระจาย พบปลาชะโด *C. micropeltes* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ช่อน *Channa striata*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Perciformes

Family Channidae

Channa striata

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกเรียวยาว ด้านหน้าของส่วนหัวมีลักษณะแบนลง ส่วนด้านท้ายของลำตัวมีลักษณะแบนทางด้านข้าง ปากกว้าง ตามีขนาดใหญ่ ด้านบนและด้านข้างของส่วนหัวมีเกล็ดขนาดใหญ่ปกคลุม ฐานครีบหลังและครีบกันยาว ครีบอกมีขนาดใหญ่ ปลายครีบหางมีลักษณะโค้งมน ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีเทาดำ ด้านหลังมีสีเข้ม ด้านข้างของลำตัวมักมีแถบสีดำพาดในแนวเฉียง ด้านท้องมีสีจาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 25 - 50 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาช่อน ได้แก่ มอญ เบ็ด ลอบ แห

การแพร่กระจาย พบปลาช่อน *C. striata* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ใบไม้ *Euryglossa harmandi*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Pleuronectiformes

Family Soleidae

Euryglossa harmandi

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปร่างกลมรีและแบนมากเป็นแบบไม่สมมาตร ส่วนปากมีขนาดเล็ก เป็นรูปโค้ง ตามีขนาดเล็กและอยู่ชิดกัน ครีบหลัง ครีบหางและครีบกันเชื่อมติดกัน ไม่มีครีบอก ส่วนปลายครีบหางมีลักษณะโค้งมน ลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลแดง มีจุดและแต้ม สีเข้มกระจายอยู่ทั่วไป บริเวณครีบหลังและครีบกันมีจุดสีดำจัดเรียงเป็นแนวบริเวณใกล้ฐานครีบ ด้านล่างของลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 6 - 10 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาใบไม้ ได้แก่ แห

การแพร่กระจาย พบปลาใบไม้ *E. harmandi* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ปักเป้า *Monotreta leiurus*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Tetraodontiformes

Family Tetraodontidae

Monotreta leiurus

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกสั้น ส่วนหัวและส่วนหางเรียวยาวเล็ก ปากมีขนาดเล็กตามีขนาดใหญ่ ครีบหลังและครีบก้นมีขนาดเล็ก อยู่ค่อนข้างทางด้านท้ายของลำตัว จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หน้าจุดเริ่มต้นของครีบก้นเล็กน้อย ครีบอกและหางมีขนาดใหญ่ปลายครีบหางโค้งมน ลำตัวมีสีเขียวปนเทาส่วนท้องมีสีขาว ด้านบนและด้านข้างของลำตัวมีจุดและปื้นสีเข้มกระจายอยู่ทั่วไป (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 7 - 12 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาปักเป้า ได้แก่ ยอ เบ็ด แห

การแพร่กระจาย พบปลาปักเป้า *M. leiurus* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ปักเป้าสุวัตติ *Monotreta suvatti*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Tetraodontiformes

Family Tetraodontidae

Monotreta suvatti

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกสั้น ส่วนหัวและส่วนหางเรียวยาว ปากยื่นยาวไปทางด้านหน้ามาก ลำตัวมีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเขียว มีจุดสีเข้มลักษณะค่อนข้างกลมขนาดใหญ่อยู่บริเวณกลางลำตัวได้จุดเริ่มต้นของครีบหลัง ด้านบนของลำตัวมีสีเข้มกว่าทางด้านล่าง ครีบอกใส ครีบหลังมีสีเทาจาง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 12 - 20 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาปักเป้าสุวดี ได้แก่ ยอ เบ็ด แห

การแพร่กระจาย พบปลาปักเป้าสุวดี *M. suvatti* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ

ปักเป้ำดำ *Monotreta fangi*

การจัดหมวดหมู่

Phylum Chordata

Subphylum Vertebrata

Class Osteichthyes

Subclass Actinopterygii

Order Tetraodontiformes

Family Tetraodontidae

Monotreta fangi

รูปร่างลักษณะ ลำตัวรูปทรงกระบอกสั้นและมีลักษณะค่อนข้างแบนทางด้านข้าง ส่วนหัวและปากมีขนาดเล็ก ตามีขนาดใหญ่ ผิวหนังมีปุ่มขนาดเล็กละเอียดอยู่ทั่วไป ครีบหลังและครีบก้นมีขนาดเล็ก อยู่ค่อนข้างทางด้านท้ายของลำตัว จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หน้าจุดเริ่มต้นของครีบก้นเล็กน้อย ครีบก้นมีขนาดใหญ่และปลายโค้งมน ลำตัวมีสีเขียวปนเทาหรือน้ำตาล มีลายอยู่ทั่วไป บริเวณด้านท้ายของลำตัวได้ครีบหลังมีจุดสีแดงที่ล้อมรอบด้วยสีดำอยู่ด้านละ 1 แห่ง (ภาพที่ 3)

ลำตัวมีขนาดยาวประมาณ 4 - 8 เซนติเมตร

เครื่องมือประมงที่ใช้จับปลาปักเป้ำดำ ได้แก่ ยอ เบ็ด แห

การแพร่กระจาย พบปลาปักเป้ำดำ *M. fangi* ในทุกบริเวณที่ทำการสำรวจ