

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

ภาคผนวก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

ภาคผนวก ก

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาคผนวก ก

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

- | | |
|---|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ จวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม | อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประไพศรี ช่อนกลิ่น | อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 3. นายแพทย์ งามวงศ์ จรัสอุไรสิน | อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 4. อาจารย์ มยุรี อนุกรมล | อาจารย์ประจำภาควิชามัธยมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 5. นาง นภา รังสิเวโรจน์ | หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดติดภาคเหนือ |
| 6. นาย อุดลย์ บุญเปล่ง | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว.
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ภาคเหนือ |

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

ภาคผนวก ข

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ภาคผนวก ข

แบบสอบถามการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการติดสารเสพติดและการเข้ารับการรักษาของผู้ติดสารเสพติด
ที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

คำชี้แจง

แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการติดสารเสพติด
และการเข้ารับการรักษาของผู้ติดสารเสพติดที่มาขอรับการบำบัดรักษาคำตอบของท่านจะเป็น ความ
ลับและนำเสนอในสรุปรวม จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามข้อมูลที่เป็น
จริงตามความรู้ ความคิดเห็นของท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษา และคำตอบของ
ท่านจะถือว่าเป็นความลับ ไม่มีผลเสียใด ๆ ต่อตัวท่าน จะนำมาใช้วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาเท่านั้น

แบบสอบถามนี้มี 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเสพติด

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงใน [] หน้าข้อความและเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับ
ท่านตามความเป็นจริง

1. เพศ [] ชาย [] หญิง
2. อายุ.....ปี
3. สถานภาพ
[] โสด [] แต่งงานและอยู่ด้วยกัน
[] แต่งงานแต่แยกกันอยู่ [] หม้าย
[] หย่า
4. ระดับการศึกษา
[] ไม่ได้เรียนหนังสือ [] ประถมต้น
[] ประถมปลาย [] มัธยมต้น
[] มัธยมปลาย [] ป.ว.ช.
[] ป.ว.ส. [] ปริญญาตรี
[] สูงกว่าปริญญาตรี [] อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
5. อาชีพ
[] นักเรียน, นักศึกษา [] ค้าขาย
[] ทำไร่, ทำนา, ทำสวน [] รับราชการ, รัฐวิสาหกิจ
[] รับจ้าง ระบุ..... []ว่างงาน
[] อื่น ๆ (โปรดระบุ).....
6. ฐานะทางครอบครัว
[] ดี [] ปานกลาง
[] ลำบาก
7. โรคประจำตัวของท่านที่ต้องรักษา โดยการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
[] ไม่มี
[] มี (ระบุชื่อโรค).....

8. ลักษณะนิสัยของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- เชื้อมันในตนเอง
- คล้อยตามคนอื่นได้ง่าย
- เก็บกด ไม่ค่อยแสดงความรู้สึก
- ไม่ยอมรับในคำแนะนำของคนอื่น ๆ
- เมื่อเผชิญปัญหาจะหงุดหงิดจนเฉียว โกรธง่าย
- คิดไตร่ตรองเมื่อเผชิญปัญหา
- เรียบร้อย อยู่ในกฎระเบียบ
- กล้าทะเลาะวิวาทกับบุคคลแวดล้อมที่ทำให้ไม่พอใจ
- อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสพติด

2.1 ข้อมูลด้านการเสพติด

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงใน [] หน้าข้อความและเติมข้อความลงในช่องว่าง

ให้ตรงกับสภาพของท่านตามความเป็นจริง

1. เริ่มเสพยาเสพติดครั้งแรก เมื่ออายุ.....ปี
2. ก่อนใช้สารเสพติด ท่านใช้สิ่งเหล่านี้มาก่อน
 - สูบบุหรี่ เพียงอย่างเดียวมาก่อน
 - ดื่มเหล้า เพียงอย่างเดียวมาก่อน
 - สูบบุหรี่และดื่มเหล้ามาก่อน
 - ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเหล้า

3. ท่านเริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรก คือ สารชนิดใด

- เฮโรอีน (ผงขาว)
- แอมเฟตามีน (ยาบ้า)
- ฝิ่น
- สารระเหย (กาว, เบนซิน, ทินเนอร์)
- กัญชา
- ยานอนหลับ ยาระงับประสาท
- อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

4. สาเหตุที่让您 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- อยากลอง
- มีปัญหาครอบครัว
- ชอบ
- มีปัญหาด้านจิตใจ
- ว่าง่าย
- ไม่รู้โทษพิษภัย
- มีปัญหาด้านอาชีพ
- มีปัญหาสุขภาพ
- มีปัญหาเกี่ยวกับคนอื่น ๆ
- เพื่อนชวน
- มีปัญหาด้านการเรียน
- อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

5. จากข้อ 4 เหตุผลที่สำคัญที่สุดในการเสพ เรียงตามลำดับ 1-3

- 1.....
- 2.....
- 3.....

6. ก่อนเข้ารับการรักษาครั้งนี้ ท่านติดสารเสพติดชนิดใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- เฮโรอีน (ผงขาว)
- แอมเฟตามีน (ยาบ้า)
- ฝิ่น
- สารระเหย (กาว, เบนซิน, ทินเนอร์)
- กัญชา
- ยานอนหลับ ยาระงับประสาท
- อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

7. ก่อนเข้ารับการรักษาครั้งนี้ ท่านเสพยาเสพติดต่อไปนี้ ก็ครั้งต่อวัน

1. ฝิ่น.....ครั้ง/วัน

ถ้าท่านขาดสารเสพติดจะมีอาการเป็นอย่างไร.....

2. แอมเฟตามีน.....ครั้ง/วัน

ถ้าท่านขาดสารเสพติดจะมีอาการเป็นอย่างไร.....

3. เฮโรอีน.....ครั้ง/วัน

ถ้าท่านขาดสารเสพติดจะมีอาการเป็นอย่างไร.....

8. ท่านติดสารเสพติดมานานเท่าใด ก่อนเข้ารับการรักษาครั้งนี้

1-3 เดือน

4-6 เดือน

1 ปี

1-3 ปี

มากกว่า 3 ปี

ปัจจัยนำ

2.2 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงใน [] หน้าข้อความตามที่ท่านพิจารณาแล้วว่า ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ในแต่ละข้อ

1. ฝิ่น ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอย่างไร

กดประสาท

กระตุ้นประสาท

ออกฤทธิ์หลายอย่าง

2. แอมเฟตามีน (ยาบ้า) จัดอยู่ในกลุ่ม ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอย่างไร

กดประสาท

กระตุ้นประสาท

ออกฤทธิ์หลายอย่าง

3. เฮโรอีน จัดอยู่ในกลุ่มออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอย่างไร
- กดประสาท
 - กระตุ้นประสาท
 - ออกฤทธิ์หลายอย่าง
4. สารเสพติดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเคลิบเคลิ้ม สมอองมีนชา สติปัญญาเชื่องช้า คือ
- ฝิ่น
 - แอมเฟตามีน (ยาบ้า)
 - เฮโรอีน
5. เมื่อเสพสารชนิดนี้ จะทำให้ร่างกายไม่มีความเหน็ดเหนื่อย ตื่นเต้นง่าย สารเสพติดชนิดนี้ ได้แก่
- ฝิ่น
 - เฮโรอีน
 - แอมเฟตามีน (ยาบ้า)
6. ถ้าเสพสารเสพติดชนิดนี้ในขนาดที่สูงมากเกินไป ผู้เสพอาจถึงแก่ความตายได้ โดยหัวใจหยุดทำงานสารเสพติดชนิดนี้ ได้แก่
- เฮโรอีน
 - ฝิ่น
 - แอมเฟตามีน (ยาบ้า)
7. ผู้ที่เสพสารชนิดนี้นานๆจะทำให้เป็นโรคจิต หลงผิดคิดว่าจะมีคนมาทำร้าย สารเสพติดชนิดนี้ ได้แก่
- เฮโรอีน
 - ฝิ่น
 - แอมเฟตามีน (ยาบ้า)
8. สารเสพติดชนิดใดต่อไปนี้มีฤทธิ์รุนแรงที่สุด
- ฝิ่น
 - แอมเฟตามีน (ยาบ้า)
 - เฮโรอีน

9. ผู้ที่เสพฝิ่นหรือเฮโรอีนนาน ๆ เมื่อไม่ได้เสพจะมีอาการดังนี้
- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องร่วง ลงแดง
 - เอะอะ อาละวาด ทำร้ายผู้อื่นหรือตัวเอง
 - ซึมเศร้า และมีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย
10. ผู้ที่เสพแอมเฟตามีน (ยาบ้า) นาน ๆ เมื่อไม่ได้เสพจะมีอาการดังนี้
- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องร่วง ลงแดง
 - เอะอะ อาละวาด ทำร้ายผู้อื่นหรือตัวเอง
 - ซึมเศร้า และมีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย
11. ข้อใดกล่าวถึงโทษของสารเสพติด
- ร่างกายอ่อนแอ สุขภาพทรุดโทรม และสร้างอุปนิสัยต้องพึ่งพิงบุคคลอื่น
 - สูญเสียเงินและทรัพย์สิน และเป็นที่รังเกียจของสังคม
 - ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
12. เมื่อมีผู้มาชักชวนให้ท่านเสพยาบ้า ท่านควรทำอย่างไร
- เสพตาม
 - ปฏิเสธ
 - เสพตามและชักชวนผู้อื่นเสพด้วย
13. ผู้เสพยาควรมีวิธีการหลีกเลี่ยงการถูกชักชวน ดังนี้
- เฉย ๆ ไม่สนใจ
 - แข็งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
 - เข้าไปห้าม ตักเตือน
14. ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ในปี 2541 ให้ถือว่าผู้ติดยาเสพติดเป็น
- ผู้ป่วย
 - ผู้วิกลจริต
 - อาชญากร
15. การถอนพิษเฮโรอีน ใ้ยาอะไร
- ทิงเจอร์ฝิ่น การบูร
 - เมธาโดน
 - ไดอะซีแพม

16. การถอนพิษยาบ้า ใ้ยาอะไร

- เมธาโดน
- ไม่มียาถอนพิษ
- ทิงเจอร์ ฟีน การบูร

17. ข้อใดเป็นโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับลงโทษผู้เสพยาบ้า

- จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท
- จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท
- จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท

2.3 แบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับสารเสพติด

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

โปรดตอบคำถามทุกข้อ

ข้อความ	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย
1. การเสพติดไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะไม่ใช่ผู้จำหน่าย
2. ถ้าพ่อเสพติด บุตรมีแนวโน้มที่จะเสพติดด้วย
3. ผู้เสพยาบ้าเป็นบุคคลที่มีจิตใจกล้าหาญ
4. ถ้าต้องการทำงานให้ได้มากขึ้น ควรกินยาบ้า
5. ท่านจะเลิกคบกับคนที่เสพยาบ้า
6. การเลิกใช้เฮโรอีนทำให้สังคมยอมรับ
7. การเสพติดเฮโรอีน 2-3 ครั้ง ไม่ทำให้ติด
8. การมีเพื่อนใช้เฮโรอีนเป็นส่วนหนึ่งทำให้ติดเฮโรอีน
9. การป้องกันยาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกคน
10. การติดสารเสพติดนั้นง่ายกว่าการรักษา
11. คนที่ติดสารเสพติดส่วนใหญ่มีปัญหาทางครอบครัวมาก่อน
12. ยาเสพติดมักนำไปสู่เฮโรอีน
13. ผู้ที่จำหน่าย หรือผลิตสารเสพติดควรได้รับการลงโทษทางกฎหมายอย่างรุนแรง
14. ผู้ที่ติดสารเสพติดจะทำให้ครอบครัวเป็นทุกข์
15. ถ้าครอบครัวมีความเข้าใจกันทำให้เลิกติดยาได้
16. สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้บุคคลนั้นไม่ติดสารเสพติดคือจิตใจของตนเอง

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

2.4 ปัจจัยด้านครอบครัว สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม	ใช่	ไม่แน่ใจ	ไม่ใช่
ปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้ท่านติดสารเสพติด			
1. ครอบครัวแตกแยก
2. สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว ไม่ราบรื่น, ทะเลาะวิวาทบ่อย ๆ
3. ครอบครัวเลี้ยงดูแบบตามใจ
4. มีบุคคลในครอบครัวติดสารเสพติด
5. เสพตามบุคคลในครอบครัว
6. เสพตามเพื่อน
7. เพื่อเข้าสังคมกับเพื่อน
8. เพื่อให้เพื่อนฝูงยอมรับ
9. ถูกบังคับจากกลุ่มเพื่อน
10. เพื่อนบ้านชวนเสพยาเสพติด
11. อาศัยอยู่ใกล้ชุมชนที่เป็นแหล่งมั่วสุมของสารเสพติด
12. ภายในชุมชนมีผู้ติดยาเสพติด

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษา

3.1 ข้อมูลด้านการเข้ารับการรักษา

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงใน [] หน้าข้อความ และเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับสภาพของท่านตามความเป็นจริง

1. ท่านเคยพยายามเลิกเสพยาเสพติดเองหรือไม่

[] ไม่เคย

[] เคย จำนวน.....ครั้ง

ถ้าเคยเลิกเสพ ครั้งที่ 1 เลิกได้นาน กลับไปเสพเพราะ

ครั้งที่ 2 เลิกได้นาน.....กลับไปเสพเพราะ.....

ครั้งที่ 3 เลิกได้นาน.....กลับไปเสพเพราะ.....

มากกว่า 3 ครั้ง เลิกได้นาน.....กลับไปเสพเพราะ.....

2. ท่านเคยเข้ารับการรักษาบำบัดรักษาก่อนการรักษาครั้งนี้หรือไม่

[] ไม่เคย

[] เคย จำนวน.....ครั้ง

หลังการบำบัดรักษา ครั้งที่ 1 ท่านเลิกยาเสพติดได้นาน วันเดือน.....ปี

ครั้งที่ 2 ท่านเลิกยาเสพติดได้นานวัน.....เดือน.....ปี

ครั้งที่ 3 ท่านเลิกยาเสพติดได้นานวัน.....เดือน.....ปี

มากกว่า 3 ครั้ง ท่านเลิกยาเสพติดได้นานวัน.....เดือน.....ปี

3. เหตุผลที่ท่านเข้ารับการรักษาบำบัดรักษา

[] ต้องการเลิกเอง

[] ครอบครัวขอร้อง

[] สุขภาพไม่ดี

[] ไม่มีเงินซื้อยา

[] หาซื้อยาก

[] สงสารครอบครัว

[] เพื่อนชักชวน

[] สถานที่บำบัดรักษาอยู่ใกล้บ้าน

[] ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม [] อื่น ๆ โปรดระบุ.....

4. ขณะเข้ารับการรักษาบำบัดรักษา ท่านปฏิบัติตามแผนการรักษาหรือไม่

[] ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจาก.....

[] ปฏิบัติตามบ้าง ไม่ปฏิบัติตามบ้าง เนื่องจาก.....

[] ไม่ค่อยปฏิบัติตาม เนื่องจาก.....

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
โปรดตอบคำถามทุกข้อ

3.2 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการเข้ารับการรักษา	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย
ปัจจัยที่ทำให้ท่านเข้ารับการรักษา			
1. ท่านเต็มใจเข้ารับการรักษา
2. ท่านพอใจต่อการรักษา
3. ท่านรู้สึกว่าการเข้ารับรักษามีประโยชน์
4. การเข้ารับการรักษาทำให้ร่างกายแข็งแรง
5. การเข้ารับการรักษาทำให้มีความสุขสบายใจ
6. การเข้ารับการรักษาทำให้มีโอกาสเรียนต่อ/ทำงาน
7. การเข้ารับการรักษาทำให้สังคมยอมรับ
8. การเข้ารับการรักษาช่วยลดความเครียด
9. การเข้ารับการรักษาทำให้เข้ากลุ่มเพื่อนได้ดีขึ้น

3.3 ปัจจัยด้านครอบครัว สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม	ใช่	ไม่แน่ใจ	ไม่ใช่
ปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้ท่านเข้ารับการรักษา			
1. พ่อ แม่ ชักชวนท่านเข้ารับการรักษา
2. พี่ น้อง ชักชวนท่านเข้ารับการรักษา
3.ญาติสนิท ชักชวนท่านเข้ารับการรักษา
4. เพื่อน ชักชวนท่านเข้ารับการรักษา
5. เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้อื่น
6. การเข้ารับการรักษาจะทำให้เพื่อนฝูง ยอมรับ
7. ท่านเข้ารับการรักษาตามบุคคลใน ครอบครัวหรือญาติ
8. ท่านเข้ารับการรักษาตามเพื่อน
9. ท่านอาศัยอยู่ใกล้ศูนย์บำบัดฯ
10. ท่านเห็นตัวอย่างบุคคลที่รักษาหาย
11. สังคมยกย่องผู้ห่างไกลยาเสพติด

3.4 ปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐ	ใช่	ไม่แน่ใจ	ไม่ใช่
ปัจจัยเอื้ออำนวยที่ทำให้ท่านเข้ารับการรักษา			
1. การปราบปรามของรัฐเข้มงวด ทำให้ซื้อยาได้ยากขึ้น
2. การรณรงค์ให้เลิกสารเสพติดเข้มแข็ง
3. การเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
4. มีมาตรการอย่างเข้มแข็งในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
5. รัฐบาลมีความจริงจัง ในการต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด
6. การรณรงค์ในสื่อ และสังคมต่อต้านยาเสพติดเข้มแข็งมากขึ้น
7. การยกเว้นโทษจูงใจให้ท่านเข้ารับการรักษา

ภาคผนวก ค

คุณภาพแบบสอบถาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

ตาราง 14 ค่าความยากง่าย(P) ค่าอำนาจจำแนก (r) เป็นรายชื่อของแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
สารเสพติด

ข้อที่	P	r
1. ผื่นออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอย่างไร	0.50	0.44
2. แอมเฟตามีน(ยาบ้า)จัดอยู่ในกลุ่มออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท อย่างไร	0.71	0.43
3. เฮโรอีนจัดอยู่ในกลุ่มออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอย่างไร	0.54	0.44
4. สารเสพติดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเคลิบเคลิ้ม สมองมึนชา สติปัญญาเซื่องช้า คือ	0.39	0.42
5. เมื่อเสพสารเสพติดชนิดนี้ จะทำให้ร่างกายไม่มีความเหน็ด เหนื่อย ตื่นเต้นง่าย สารเสพติดชนิดนี้ได้แก่	0.76	0.47
6. ถ้าเสพสารเสพติดชนิดนี้ในขนาดสูงมากเกินไป ผู้เสพอาจถึง กับความตายได้โดยหัวใจหยุดทำงาน สารเสพติดชนิดนี้ได้แก่	0.69	0.58
7. ผู้ที่เสพสารเสพติดชนิดนี้นานๆจะทำให้เป็นโรคจิต หลงผิด คิดว่าจะมีคนมาทำร้าย สารเสพติดชนิดนี้ได้แก่	0.79	0.40
8. สารเสพติดชนิดใดต่อไปนี้มีฤทธิ์รุนแรงที่สุด	0.74	0.50
9. ผู้ที่เสพฝิ่นหรือเฮโรอีนนานๆเมื่อไม่ได้เสพจะมีอาการดังนี้	0.87	0.40
10. ผู้ที่เสพแอมเฟตามีน(ยาบ้า)นานๆเมื่อไม่ได้เสพจะมีอาการดังนี้	0.77	0.32
11. ข้อใดกล่าวถึงโทษของสารเสพติด	0.83	0.51
12. เมื่อมีผู้มาชักชวนให้ท่านเสพยาบ้า ท่านควรทำอย่างไร	0.87	0.63
13. ผู้เสพยาควรมีวิธีการหลีกเลี่ยงการถูกชักชวนดังนี้	0.69	0.37
14. ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในปี 2541ให้ถือว่าผู้ติด ยาเสพติดเป็น	0.69	0.58
15. การถอนพิษเฮโรอีน ใช้อย่างไร	0.63	0.47
16. การถอนพิษยาบ้า ใช้อย่างไร	0.54	0.44
17. ข้อใดเป็นโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับลงโทษผู้เสพยาบ้า	0.21	0.57

ตาราง 15 อำนาจจำแนกของแบบสอบถาม แบบวัดทัศนคติต่อสารเสพติด

ข้อ ที่	ข้อความ	\bar{X}_H	S_H	\bar{X}_L	S_L	t
1.	การเสพติดไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะไม่ใช่ผู้ จำหน่าย	0.88	0.49	0.18	0.81	3.086**
2.	ถ้าพ่อเสพติดบุหรี่มีแนวโน้มที่จะเสพติดด้วย	0.65	0.61	0.53	0.72	5.164**
3.	ผู้เสพติดบ้างเป็นบุคคลที่มีจิตใจกล้าหาญ	0.59	0.62	0.12	0.78	2.921**
4.	ถ้าต้องการทำงานให้ได้มากขึ้นควรกินยาบ้า	0.82	0.53	0.12	0.86	3.852**
5.	ท่านจะเลิกคบกับคนที่เสพติดบ้าง	0.53	0.62	0.18	0.73	3.036**
6.	การเลิกใช้เฮโรอีนทำให้สังคมยอมรับ	0.88	0.49	0.12	0.78	4.484**
7.	การเสพติดเฮโรอีน 2-3 ครั้งไม่ทำให้ติด	0.76	0.44	0.00	0.66	4.295**
8.	การมีเพื่อนใช้เฮโรอีนเป็นส่วนหนึ่งทำให้ติดเฮโรอีน	0.94	0.24	0.12	0.86	3.810**
9.	การป้องกันยาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกคน	1.00	0.00	0.41	0.71	3.405**
10.	การติดสารเสพติดนั้นง่ายกว่าการรักษา	0.88	0.49	0.24	0.83	2.772**
11.	คนที่ติดสารเสพติดส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัว มาก่อน	0.88	0.33	0.12	0.70	5.343**
12.	ยาเสพติดมักนำไปสู่เฮโรอีน	0.88	0.33	0.24	0.56	7.056**
13.	ผู้ที่จำหน่ายหรือผลิตสารเสพติดควรได้รับโทษ ทางกฎหมายอย่างรุนแรง	1.00	0.00	0.41	0.71	3.405**
14.	ผู้ที่ติดสารเสพติดจะทำให้ครอบครัวเป็นทุกข์	0.94	0.24	0.47	0.72	2.562*
15.	ถ้าครอบครัวมีความเข้าใจกันทำให้เลิกติดยาได้	1.00	0.00	0.41	0.71	3.405**
16.	สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้บุคคลนั้นไม่ติดสารเสพติด คือจิตใจของตนเอง	1.00	0.00	0.47	0.71	3.043**

ตาราง 16 อำนาจจำแนกของแบบสอบถามปัจจัยด้านครอบครัวสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ติดสารเสพติด

ข้อที่	ข้อความ	\bar{X}_H	S_H	\bar{X}_L	S_L	t
1.	ครอบครัวแตกแยก	2.82	0.53	1.77	0.75	4.748**
2.	สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวไม่ราบรื่น ทะเลาะวิวาทบ่อยๆ	2.94	0.24	1.53	0.72	7.686**
3.	ครอบครัวเลี้ยงดูแบบตามใจ	2.77	0.44	2.06	0.83	3.111**
4.	มีบุคคลในครอบครัวติดสารเสพติด	2.71	0.59	1.18	0.39	8.918**
5.	เสพติดตามบุคคลในครอบครัว	2.65	0.70	1.12	0.33	8.121**
6.	เสพติดตามเพื่อน	3.00	0.00	2.12	0.86	4.243**
7.	เพื่อเข้าสังคมกับเพื่อน	2.82	0.39	1.41	0.62	7.945**
8.	เพื่อให้เพื่อนฝูงยอมรับ	2.76	0.44	1.41	0.62	7.366**
9.	ถูกบังคับจากกลุ่มเพื่อน	2.24	0.75	1.29	0.59	4.064**
10.	เพื่อนบ้านชวนเสพสารเสพติด	2.53	0.72	1.41	0.62	4.865**
11.	อาศัยอยู่ในชุมชนที่เป็นแหล่งมั่วสุมของสารเสพติด	2.88	0.33	1.76	0.83	5.147**
12.	ภายในชุมชนมีผู้ติดยาเสพติด	2.82	0.39	2.00	0.94	3.347**

ตาราง 17 อำนาจจำแนกของแบบสอบถามปัจจัยด้านความสามารถในการหาได้ง่าย ของสารเสพติด
กฎหมาย และนโยบายของรัฐที่เอื้ออำนวยให้ติดสารเสพติด

ข้อที่	ข้อความ	\bar{X}_H	S_H	\bar{X}_L	S_L	t
1.	ท่านสามารถหาซื้อสารเสพติดได้ง่ายตามที่ ท่านต้องการทุกครั้ง	3.00	0.00	1.88	0.78	5.899**
2.	แหล่งผลิตสารเสพติดอยู่ในชุมชนที่อาศัย	2.94	0.24	1.47	0.62	9.054**
3.	แหล่งจำหน่ายสารเสพติดอยู่ในชุมชน	3.00	0.00	1.53	0.72	8.452**
4.	สารเสพติดเป็นที่นิยมแพร่หลายในชุมชน	3.00	0.00	1.82	0.81	5.996**
5.	รัฐบาลไม่มีความจริงจังในการปราบปราม สารเสพติด	2.82	0.39	1.76	0.66	5.657**
6.	ความผิดในการลงโทษสารเสพติดไม่รุนแรง	2.82	0.39	1.82	0.73	4.986**
7.	รัฐบาลมุ่งเน้นการปราบปรามสารเสพติด มากกว่าการป้องกัน	3.00	0.00	2.24	0.90	3.490**

ตาราง 18 อำนาจจำแนกของแบบสอบถาม แบบวัดทัศนคติต่อการเข้ารับการรักษา

ข้อที่	ข้อความ	\bar{X}_H	S_H	\bar{X}_L	S_L	t
1.	ท่านเต็มใจเข้ารับการรักษา	1.00	0.00	0.53	0.72	2.704
2.	ท่านพอใจต่อการรักษา	1.00	0.00	0.53	0.72	2.704
3.	ท่านรู้สึกว่าการเข้ารับการมีประโยชน์	1.00	0.00	0.65	0.61	2.400
4.	การเข้ารับการรักษา ทำให้ร่างกายแข็งแรง	1.00	0.00	0.53	0.72	2.704
5.	การเข้ารับการรักษาทำให้มีความสุขสบายใจ	1.00	0.00	0.00	0.79	5.215**
6.	การเข้ารับการรักษาทำให้มีโอกาสเรียนต่อ/ ทำงาน	1.00	0.00	0.00	0.79	5.215**
7.	การเข้ารับการรักษาทำให้สังคมยอมรับ	1.00	0.00	0.00	0.75	5.191**
8.	การเข้ารับการรักษาช่วยคลายความเครียด	1.00	0.00	0.12	0.70	6.615**
9.	การเข้ารับการรักษาทำให้เข้ากลุ่มเพื่อนได้ดีขึ้น	1.00	0.00	0.24	0.66	4.747**

ตาราง 19 อำนาจจำแนกของแบบสอบถามปัจจัยด้านครอบครัว สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษา

ข้อที่	ข้อความ	\bar{X}_H	S_H	\bar{X}_L	S_L	t
1.	พ่อ แม่ ชักชวนท่านเข้ารับกาณรักษา	3.00	0.00	2.53	0.80	2.426 [*]
2.	พี่ น้อง ชักชวนท่านเข้ารับกาณรักษา	3.00	0.00	2.41	0.94	2.582 [*]
3.	ญาติสนิท ชักชวนท่านเข้ารับการรักษา	3.00	0.00	1.41	0.71	9.194 ^{**}
4.	เพื่อน ชักชวนท่านเข้ารับการรักษา	2.94	0.24	1.35	0.70	8.818 ^{**}
5.	เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้อื่น	2.94	0.24	2.00	0.79	4.693 ^{**}
6.	การเข้ารับการรักษาจะทำให้เพื่อนฝูงยอมรับ	3.00	0.00	1.94	0.90	4.854 ^{**}
7.	ท่านเข้ารับการรักษาตามบุคคลในครอบครัวหรือญาติ	2.88	0.49	1.24	0.56	9.145 ^{**}
8.	ท่านเข้ารับการรักษาตามเพื่อน	2.88	0.49	1.06	0.24	13.864 ^{**}
9.	ท่านอาศัยอยู่ใกล้ศูนย์บำบัดฯ	2.47	0.87	1.18	0.53	5.222 ^{**}
10.	ท่านเห็นตัวอย่างบุคคลที่รักษาหาย	2.88	0.33	1.59	0.87	5.728 ^{**}
11.	สังคมยกย่องผู้ห่างไกลยาเสพติด	2.94	0.24	2.24	0.90	3.111 ^{**}

ตาราง 20 อำนาจจำแนกของแบบสอบถามปัจจัยด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐ ที่เอื้ออำนวยให้เข้ารับการรักษา

ลำดับที่	ข้อความ	\bar{X}_H	S_H	\bar{X}_L	S_L	t
1.	การปราบปรามของรัฐเข้มงวดทำให้ซื้อยาได้ยากขึ้น	3.00	0.00	1.47	0.62	10.101**
2.	การรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ติดเข้มแข็ง	3.00	0.00	1.53	0.72	8.452**
3.	การเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย	3.00	0.00	2.35	0.93	2.864**
4.	มีมาตรการอย่างเข้มแข็งในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่	3.00	0.00	1.53	0.62	9.731**
5.	รัฐบาลมีความจริงจัง ในการต่อต้านและปราบปรามยาเสพติด	3.00	0.00	1.76	0.75	6.769**
6.	การรณรงค์ในสื่อ และสังคมต่อต้านยาเสพติดเข้มแข็งมากขึ้น	3.00	0.00	1.71	0.85	6.286**
7.	การยกเว้นโทษจูงใจให้ท่านเข้ารับการรักษา	3.00	0.00	1.65	0.86	6.473**

ภาคผนวก ง

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

ภาคผนวก ง

เปรียบเทียบข้อหาและอัตราโทษที่สำคัญ

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

	ยาเสพติดให้โทษประเภท 1	ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2
1. ผลิต	จำคุกตลอดชีวิต(ม.65ว.1)	จำคุก 1 ปีถึง 10 ปี
2. นำเข้า	กระทำเพื่อจำหน่ายประหารชีวิต(ม.65 ว.2)	ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท-100,000 บาท
3. ส่งออก	มีปริมาณตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป(สาร บริสุทธิ์) ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อ จำหน่าย ประหารชีวิต(ม.66 , ม.15)	ถ้าเป็นมอร์ฟีน ฝิ่นหรือ โคคาอีน จำคุก 20 ปี ถึง ตลอดชีวิต และ ปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 500,000 บาท
4. จำหน่าย	มีปริมาณไม่เกิน 100 กรัม (สารบริสุทธิ์) จำคุก 5 ปีถึงตลอดชีวิต และ ปรับ 50,000- 500,000 บาท(ม.66 , ว.1)	จำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี และ ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท-100,000 บาท
5. ครอบ ครองเพื่อ จำหน่าย	มีปริมาณเกิน 100 กรัม(สารบริสุทธิ์) จำ คุกตลอดชีวิต หรือ ประหารชีวิต(ม.66 , ว.2)	ถ้าเป็นมอร์ฟีน ฝิ่นหรือ โคคาอีน มีปริมาณ ไม่เกิน 100 กรัม จำคุก 3 -20 ปี และ ปรับ ตั้งแต่ 30,000 บาทถึง 200,000 บาท มี ปริมาณเกิน 100 กรัม จำคุก 5 ปี-ตลอดชีวิต ปรับตั้งแต่ 50,000-500,000 บาท
6. ครอบ ครอง	มีปริมาณไม่เกิน 0.5 กรัม จำคุก 1-5 ปี และ ปรับ 20,000- 100,000 บาท (ม.106 , ว.1) มีปริมาณเกิน 0.5 กรัม จำคุก 5 ปี ถึง 20ปี และ ปรับ 100,000- 400,000 บาท(ม.106 ทวิ)	มีปริมาณไม่เกิน 100 กรัมจำคุกไม่เกิน 4 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บาท
7. เสพ	จำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท(ม.91)	จำคุก ตั้งแต่ 6เดือน ถึง 10 ปี-และ ปรับตั้งแต่ 50,000-100,000 บาท(ม.91)

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นาง วรณภา สุขเสถียร
วัน เดือน ปีเกิด	8 เมษายน 2511
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2529	ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2531	ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2539	พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน	
พ.ศ. 2531-2534	ผู้ช่วยพยาบาล ดึกผู้ป่วยพิเศษ 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน	พยาบาลประจำการ ดึกผู้ป่วยพิเศษ 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่